

# 怎樣採得好稻種？

——雄輝張——

①沒有發生病害的稻田，才可以採種田。如有稗子及異品種，必須連根拔除（最好在抽穗前拔除）。混雜有色稻株，在朝露未乾前的陽光下，容易發現，此時拔除，最為方便。紅色稻株通常較早抽穗，容易識別，發現時隨時拔除。

②水稻完全前熟三、四日，自抽穗後約經三十至三十五日，全穗變黃色，穗基部還有二、三粒綠色谷粒時，為稻種的採收適期。過早採收，種子還沒成熟，發芽不整齊。過遲採收，種子裂痕多，也不適宜。

③採收稻田的中央部份，留作稻種。靠近田埂的稻株，應該分開收種，不要混雜在一起。收穫後，應與其他稻谷分開脫谷，調製。

④稻種需要量少時，最好能行稻穗選種。選擇稻粒豐滿，具有品種特性的大穗，留作稻種。

⑤稻種晒場，以水泥晒場為宜。使用前應該打掃乾淨。晒場周圍也要清潔。

⑥收穫後的稻種，應該立即晒乾。與其他稻谷一起乾燥時，稻種應該放在晒場風頭端乾燥。最好用稻桿圍繞，避免混雜。


⑦一坪半地可晒一百臺斤稻種。將稻種披展為南北向波形長條。每隔三十分鐘，向旁移去一部份稻種，分三次把它移完另成一長條。稻種量很少時，均勻地撒佈在晒場，上面蓋紙張，以免陽光直射。

⑧上午十一時至下午二時之間，溫度急激升高，稻種容易發生裂痕，應該增加翻轉的次數。

⑨第二期作晒三、四天就可以。

⑩乾燥後的稻種，用「風鼓」吹去夾雜物等。最好反覆吹二、三次。「風鼓」在使用前，須先注意打掃清潔，不得夾雜任何東西。

⑪精選後的稻種，放在密封的鉛桶或鉛桶貯藏。如果沒有這種容器時，可把稻種裝入布袋，再放進玻璃布袋（塑膠布袋），密縫袋口，放在貯藏庫內木架上，以防濕氣。貯藏處所要通風良好，避免溫度急激變化。



（乾燥後的稻種，用「風鼓」吹去夾雜物。）

這兩種小麥，分蘗力都很旺盛，所以，栽植距離行間以五十公分，播間（播種條的寬度）以二十公分為宜。  
· 有水利可灌溉，或耕地較為肥沃時，行距應放寬為六十公分，播間仍以二十公分為宜。

## 留意防治白粉病

生育時期氮肥過多，多濕，而又密植時，較易發生白粉病。用石灰硫磺合劑八十至二百倍液，在開始發生時（普通在幼穗形成期至抽穗始期發病），噴射一次，以後每隔十日再噴一次，繼續二次。或用硫磺粉劑，在開始發病時撒佈一次，以後每隔一星期撒佈一次，繼續三次。

## 怎樣施用基追肥

每公頃最適施肥量如下：

①基肥：

堆肥一

萬二千公斤

。硫酸銨一

百七十公斤

。過磷酸鈣

三百公斤。

氯化鉀八十

公斤。

②追肥：

在播種

後二十五日

內，施硫酸

銨一百公斤

為追肥。



（左起）蒙南改良場李文周場長，農復會張憲秋組長，沈宗瀚委員，鄭仲學技正，參觀新種小麥示範田。