

移植前後的

菸苗病蟲害

黃東麟

鑲嵌病 觀察中心幼嫩葉芽，如果發現葉脈附近顏色褪淡、變黃，使葉脈和葉片週圍組織特別明顯，帶綠色，這就是患病的早期徵象。以後才會逐漸顯出濃淡嵌紋病徵。

移植前的防治法如下：①用一—五〇「福馬林」液，或肥皂水洗淨器具。

②檢查苗床，拔除病苗。病株附近的菸苗最好不要取用。③工作前用肥皂洗手。或者溶一小桶肥皂水（五％），每取苗十多株，就洗手一次。

本圍期的防治法如下：①培土前檢查田間，拔除病株。②照苗床消毒方式消毒農具。③儘可能減少菸株損傷，或互相接觸。

移植苗缺株 移植後半月內，往往斷續或一時發生若干缺株。

病苗一時發生很多，在近地面的嫩莖上，現出褐色下凹斑塊時，防治方法如下：①稍延遲移植。②苗床加施鉀肥，並且疏苗、中耕。③本圍內淺植，或加局部覆蓋物等。④枯死株應儘早拔除、補植才好。

如果缺株是少數，分散發生；病株變色部位帶潤濕性，病部早晨可以看見白色棉狀物；這類大致是被舞病菌、腰折病菌等侵害。本病的防治法為：①移植前一、二日，用二千倍「谷樂生」液代替澆水澆苗床。②拔除缺株後，還須在土面淋注上述藥液，才可以補植。


英製(地霸王牌)

Landmaster

耕耘機

四匹半至六馬力

每台新台幣壹萬陸仟參佰元正(如圖)



△△△
農比收
友貨入
思比最
寶價好

△△△
用機價
途靈錢
最器最
多巧小

德友農機供應公司

臺北市武昌街二段五十七號
臺北郵局1252號信箱
電話：32265·33911

詳細說明
函索即寄