

固殺松劇毒 用時要小心

【問】：最近鎮農會，特配一種紅鈴蟲特效藥「固殺松」，未知其藥效及其用法，藥毒，藥害如何？（臺南縣鹽水鎮張朝卿）

【答】：固殺松為有機磷殺蟲劑之一種，有殘毒作用，故殺蟲持久力比用富粒多或馬拉松等為強。對於人之毒力亦很大，用時請特別小心，其毒力僅次於把拉松。防治紅鈴蟲時最好加用七五%可濕性DDT粉劑，可增加防治效力，稀釋倍數通常為五百倍，至稀一千倍。

此藥劑之解毒方法，可用PAM注射，或用阿托品注射或吞服。

藥害在植物上，有記錄者很少，但如應用於棉花上，吐絮期不可施用，否則棉子內會留有固殺松，將來不可供榨油食用。（陶家駒）

油菜注意管理 提高種子產量

【問】：日本油菜，只開花而不結莢，不知是什麼原因？（雲林縣崙背鄉楊和成）

【答】：油菜開花不結莢原因有下列各點：
①土壤過於乾燥，②蚜蟲為害，③缺乏肥料，④天氣不佳，授精困難。故應注意病蟲害之防除及施肥灌水等，才能提高種子產量。（陳文郁）

分類廣告

- ①本欄廣告以讀者及農友為服務對象。
- ②本欄廣告以五行為限，每行九字，酬收成本費六元。
- ③廣告費請利用郵政劃匯五九三〇號，如用電話接洽請撥四七一三三號。
- ④來稿與廣告費請在出版兩週前一併寄到。

啓事
農友服務起見，特自二十一期（十一月一日起）將此欄分類廣告

竹材建築前 浸藥防蟲蛀

【問】：現時採伐的竹子用作建築材料，百分之百的被蛀蟲損害，請問有無藥來防治？（高雄縣旗山鎮柯政文）

【答】：在建築前之竹材，用DDT七五%可濕性粉加水四百倍，浸漬或撒布，而後用來建築，可免為害，或用地特靈粉加水處理更好。（陶家駒）

糧局巴拉松乳劑 成品合國際標準

【問】：農會售出之巴拉松乳劑藥液，加水後藥色不同，是否成份有異？（屏東縣內埔鄉張運發）

【答】：本省糧食局委託中農、五豐化工廠加工之巴拉松乳劑，其主要成份為巴拉松四七%。該兩化工廠加工之成品均屬相同，但每年加工該項農藥所使用之乳劑，因採購地區及種類不同，以致加工成品藥液之顏色，可能有異，上述乳劑於採購之前，經檢驗符合標準後始行採用，其乳化情形極為良好，且加工之成品亦經送請有關機關檢驗，結果均合國際標準，對於防治蟲害特具功效。（臺灣省糧食局）


附啓：本刊圖書測驗獎品，已經全部發完，又第九獎名額，應以九卷十三——十四期為準。

圖書

告，專供讀者農友刊登買賣及交換產品種子等啓事，除原已訂有合同之廣告登至期滿為止外，其它超出五行篇幅之商家營業廣告，恕不刊登於本欄內。本刊廣告索以效力宏大著稱，歡迎各地讀者農友多利用。廣告部啓

三版增訂加入圖130副
植物病理學 邱祖
詳論臺灣作物各種病害每冊16元郵政劃匯
508號力行書局發行

種地鴨 雛每
五天應出一次。每次
有壹仟隻可出售請早
訂定按期飼育。雲林
縣土庫鎮後埔里。
慶成鴨鴨場



養雞肥大的良藥

雞 球 虫 病 立 治

動 物 用



樂梅淨鈉 ROMEZIN SODA

對家雞的白喉、雞痘、傳染性滴痢等
也有顯著者優秀的功効

【包裝】 末 20, 100, 5000公分，
片 100, 500片



批發處 田邊製藥株式會社 大阪市東區道修町
總代理店 興南大藥房 台北市博愛路59號

預防紅痢、疫痢等腸疾病

最新腸內殺菌劑



肚瀉、腸炎、食傷時請試用
最能見効之胃麻保爾無。
胃麻保爾無亦具有預防腸傳
染病之効果。

包裝 20片 50片 100片

全島有名藥店發售
台灣總代理店

興南大藥房

台北市博愛路59號



田邊製藥