

棉田的後期管理

蘇聯

今年棉花，雖遭數次颶風水災襲擊，造成相當大的損害，但因本省氣候溫暖，棉株又具再生能力，所以，現在棉株又已恢復生長。不過生長後期的棉花，不能只看到不少棉鈴，就覺得滿意，不再小心繼續管理、防治病蟲，致使棉株常萌孽芽，叢生枝葉，發生病蟲，影響棉株生長，降低產量品質。

其實，如果管理得當，棉株結鈴吐絮，可以延續至明春棉株枯死時。因此，要棉花得到良好收成

，必須使後期棉鈴不生病蟲，鈴大而多，且能裂開吐絮。就是說，後期管理工作做得好，才能算栽培成功，確保收成。棉花生長後期的管理要點如下：

一、棉株整理

災後棉株，經扶起管理後，將由棉株主幹下面及果枝節間，萌出很多孽芽，如果讓它自然生長，不但影響噴藥效果，且會使棉株枝葉叢生，減少結鈴。因此，除保留主幹上面的生長點及正常的果枝以外，近地面所萌發的新芽，及果枝節間所出的孽芽，應全部摘去，千萬不可保留。

二、病蟲害防治

(1) 噴射藥劑 災後棉田生長後期，病蟲害特別嚴重，應當注意噴藥防治。後期棉田，金鋼鑽與紅鈴蟲，多潛伏苞蕾嫩鈴中繁殖為害；時期長，程度又很兇猛，每代都從後期的花蕾幼鈴上開始，吃一個毀一個，漸次移轉到大的棉鈴上去。所以這個時期的防治，必須選用有高度延毒作用的農藥，如「安特靈」、「固殺松」等，並要加高濃度，每隔十至十二天噴射一次。

噴射時，要對準花蕾棉鈴，以及老枝葉的背面，以防治鈴蟲，及為害棉葉的紅蜘蛛等。

料飼助補的長生進促健保等猪鴨雞

請試用!!



房藥會農
售有行料飼

撥劃政郵

另--八三 六之另八一安長鑊橋板 品出廠物藥畜家春鴻