

理管培栽的茄番用工加

——玫瑰林——

(續上期) 四、深耕平畦定植

深耕整地 前作物收穫後，立即深耕，深度約二十公分。定植前二星期，均勻施下基肥，深深犁入土中，並充分搗碎土塊，耙平。栽培番茄，每分地施用堆肥一千至二千公斤，人糞尿四百至六百公斤，硫酸銨三十至三十五公斤，過磷酸鈣三十至五十公斤，氯化鉀十五至二十公斤。堆肥全量做基肥施用，在定植前二星期犁入土中。過磷酸鈣全量及硫酸銨、氯化鉀之半量，在整地時做基肥施用，其餘半量，做為追肥，分二至三次施用。

臺灣南部栽培期間剛好是乾燥季節，所以，應做平畦栽培。定植前做好淺溝，等待定植。

定植時期 播種後約二十五日至四十日。本葉展開五至六葉時，為定植適期。選陰天或無風的下午定植。掘苗前，苗床須預先充分灌水。

定植距離 畦距九十至一百二十公分，株距五十至七十公分。矮生品種可密植，蔓性品種應疏植。一般密植可得到較高的產量，但顧及管理採收工作的方便，最好採用大畦距小株距。

帶土掘苗，定植宜稍深。攪土後，在離根約九公分處，做成凹陷的環溝，充分灌水於溝內。以後數日，須每日充分灌水，至幼株成活為止。

五、留心肥培管理

中耕除草 中耕兼行除草。在定植後一個月內，應徹底除草。中耕深度，不要超過五公分。第一次中耕可靠近株旁，以後逐漸遠離，至莖葉繁茂，全面遮蔽畦面以前，可停止除草。

追肥 定植後約十日，在株旁施用第一次追肥。以後每隔二至三星期，視生長情形再施用追肥。通常與中耕除草同時施用追肥。每次施肥量不可過多。

培土 第一次追肥時稍加培土。第二次追肥時再培土一次。

灌溉及排水 在生育期間，視土壤乾燥情形，行畦溝灌溉。一次灌溉水量，以足夠濕潤全部根羣範圍的土壤為度。即將開始採收前的一次灌溉，最為重要，以後不需再灌溉，這樣可以避免裂果，並防止果實接觸濕潤土壤而腐爛。如遇降雨，應立即排水。


臺灣南部自十月至翌年四月為乾燥期，適於番茄放任栽培。但是生育期間仍須注意病蟲害防治，每隔二星期撒佈「大生」(四百倍)及「馬拉松」(五〇%乳劑八百倍)藥液。



③ 市城全綠紅燈夜
，天半放球氣粒三
，弟兄的海人山人
。批大一物買觀參



② 民鄉來路五北南
，興高真熱鬧了看
，身閃相客換馬車
。神精費意注張緊



① 熱鬧真近北臺
，節十双行遊萬廿
，節復光五廿月十
。熱鬧也覽展業商

街路買物愛注意不是假便是無好物。

賴萬詞 老金圖

