

體重 = 胸圍 × 胸圍 × 體長 ÷ 300

### 牛體重估計公式

長度用「英吋」計算，所算得體重為「磅」。例如有一牛，胸圍為八〇吋，體長七〇吋，代入公式算得體重為一四九三·三磅。

胸圍應在背後量，體長指尻至肩尖的長度。成年牛馬，應以尻至肩尖後約一英吋的長度，作為體長。量胸圍時，須拉緊量尺。測量時，應使牛站正，頭部直向前方。

肉牛、乳牛、兼用牛、肥牛、雜種牛等，用這公式估計，最大差異為百分之五。（季培元）

### 六、防治病蟲為害

**疫病** ①噴射六——八斗式石灰半量波爾多液或「大生」液四百倍防治。十二月中下旬後撒佈二——三次預防。②避免茄科作物的連栽。③儘早摘除病果深埋地下。④栽植不可過密，並防止徒長，增進通風。

**輪紋病** ①消毒種子。②避免連栽茄科作物。③噴射四百倍「大生」液或鹼性硫酸銅。④清除寄生雜草。⑤前作物避免茄科及瓜類。⑥觸及病株農具或雙手必須清洗，然後再接觸健全植株。⑦及早拔除病株燒却。⑧驅除蚜蟲及浮塵子。⑨在園中不可吸煙。

**斑點病** ①消毒種子。②實行輪栽。③每隔七至十日噴射波爾多液或「大生」液一次。

**果頂腐爛病** ①選用土層深厚，保水力強的土壤栽培。②避免偏用氮肥，供給充分過磷酸鈣及鉀肥。③灌溉使土壤保持適當濕度。④選擇抗病性品種。⑤土壤中供給適量鈣質（石灰）。

⑥氮肥要均勻施用，不可在前期施用太多後期施用太少。⑦發病時葉面噴施氯化鈣二百倍溶液，每星期二次，連續二、三期。


**煙草蛾** 撒佈一〇% DDT 粉劑，或八百至一千倍「馬拉松」乳劑三次；初着果時開始，每隔十至十四日噴藥一次。

**斜紋夜蛾（夜盜蟲）** 撒佈一〇% DDT 或八百至一千倍「馬拉松」乳劑。②前後作避免根瘤線蟲病 ①論拔中栽培木本科作物二——三年，最好有水稻配合輪栽。②前後作避免

栽培、茄、瓜類、胡、蘿蔔、煙、草、黃麻、等。③部、份、肥、用、肥、氮、化、鈣、用、肥、施。



⑥ 商賈人緊了去，  
假覺騙時已遲，  
街路買物愛注意，  
北來吃虧不值錢。



⑤ 鄉村有人愛便宜，  
聽着便宜就喜歡，  
趕提錢買落去，  
不知物件假騙物。



④ 北門街路有商人，  
賣物好嚙真認真，  
叫聲價實真笑面，  
大家看做好商人。