

避免使用。並且，應該儘量避免在附近上述各類雜草或作物的土地栽培西瓜，以防傳染。

⑤ 注意管理：毒素病在植株生長衰弱或株上莖葉損傷時最容易侵染。所以，栽培時，應該注意施肥管理，使植株生長強健，抵抗病害。而且不要摘心，不要損傷莖葉，以防病原侵入。

⑥ 防止病菌進入瓜園：應禁止閒人進入瓜園，而且要徹底驅除害蟲。

⑦ 燒毀病株：發現病株時，應迅速拔除燒掉。觸到病株的手或農器具，應用肥皂或一千倍昇汞液消毒。（全文完）

堆肥運到田裡應即耕入土中

本省農友，因為堆肥舍小，每過一段時期，堆肥差不多快腐爛時，就先搬到田裡，堆在農路傍邊或田裡，一直放到下一期作物種植時才使用。放置時間，有時長到幾個月，以致堆肥經長時間的風雨侵襲，損失大部分的肥分。

又製造「土糞」的農友，因為土糞坑容量有限，在土糞坑堆滿後，不得不清理一次。清出的「土糞」，有的在土糞坑附近堆積，有的就搬到田裡或堆放在靠近農田的農道上。

有些農友，因為堆肥使用量多，恐怕到時無法及時運到田裡，因此，就利用農閒期，提早把堆肥運到田裡，堆積起來預備應用。

上述這三種情形，在本省各地農村，都很普遍。我們可以在野外看到一堆一堆堆放在田裡或農道上的堆肥。這種現象是不好的，請採用下列方法改進或補救：

（1）堆肥已經腐熟，可是還沒到施用時期時，應該盡量存放在堆肥舍裡，等到要施用時才搬出去。

（2）堆肥運到田裡後，應該立即耕入土壤內。所以，應先整地後，再搬運堆肥。

（3）堆肥舍小，無法在堆肥舍裡堆放，或土糞坑已經堆滿，須要清理時，應在堆肥舍附近或土糞坑傍邊，覓得一陰涼避風的地方（最好在樹蔭底下）堆放，並且應加一些過磷酸石灰充分混合後，用腳踏緊堆肥四周及上面，用稻草、草蓆等密蓋起來。


（4）假如需要提早運到田裡堆放，或已經堆放在田裡的堆肥，應該採用下述方法處理：

① 不要少量堆放多處，應把所有搬出去的堆肥，堆放在一起。

② 用腳踏緊後，用泥土密閉四周及上面，再用稻草草蓆覆蓋。

③ 堆放時，混合一些過磷酸石灰，以防止氮肥損失。

④ 假如堆肥還沒完全腐熟，要時常加水或人糞尿。（張萬來）



（。中土入耕即應，裡田到運肥堆）



⑥ 水火無情，我們所知道的，火燒真有影，原無原，怪火防小心，大。



⑤ 注意線電內（屋）厝，字細着斗熨爐電，視巡要線電常，遲延莫換緊線（壞）呆。



④ 主婦放事着要，氣清掃要着（房廚）脚灶，字細真要着草柴，除清要（厝火）尿火前睡。