「可利生」一千至一千五百倍液防治。「可利生」的藥效很好，可不必提前去施藥。等到菸葉生長茂密時，注意是否有白粉病感染。等發現了病徵，才開始全面噴佈第一次藥液。通常，二星期後再施用一次就可以。假如在噴藥後遇大雨，或者病勢進展激烈時，可以多噴一次（一共三次），並且採用較高的濃度。

蚜蟲　從大培土期至摘芯間，菸田內隨時都會有蚜蟲侵入，繁殖蔓延。蚜蟲不但直接損害菸葉品質產量，而且也是胡瓜型鑲嵌病的媒介。防除蚜蟲，可採用省產「魚藤精」三·五%乳劑五百倍，在一星期內連續施用二次。施藥時，必須全菸株各葉片正反面都噴到，尤其要特別注意噴射菸芯上捲合部份。受害嚴重時，可以改用「馬拉松」一千至二千倍液，與PM或「巴拉松」二千至三千倍液防治。PM及「巴拉松」對人畜毒力猛烈，用時應當特別注意。在摘芯以後，絕對不要用。實際上，蚜蟲很少有為害嚴重的情形，毒力強的藥劑，應當儘可能少用。

夜盜蟲·青蟲　夜盜蟲與青蟲普通都是局部分散發生，如果能夠在小培土與摘芯期各噴佈省產DDT二五%乳劑二百五十至五百倍各一次，另外視蟲害發生情形全面或局部再施藥，便可有效的防治。「安特靈」乳劑只可在初期採用，如在後期施用，比「巴拉松」更有礙衛生，希望農友們特別愼重。現在有新藥「生紋」(Sevin) 能殺滅椿象類害蟲，對人畜毒性較為溫和，農友可以購用。

夜盜蟲

副業養鷄成功的途徑

廷生

(1)養鷄有三個原則—細心，耐心，決心。養鷄的人都失敗在半途而廢。細心忍耐而又能堅持到底的，絕對成功。

(2)不要貪多，一個家庭視人口多少，只能養二十隻到五十隻鷄。最大家庭，像鄉村農戶，頂多也不能超出一百隻。

(3)不要省錢，要有優良的品種，理想的鷄舍，標準的器械，品質好的飼料。省小錢一定吃大虧。

(4)自己家庭環境，是否適宜養鷄，在你的家庭環境當中，那一塊地位適宜建造鷄舍，應該先請有經驗的人或者專家來勘定。

(3)不要亂買小鷄，如果找不到信用可靠的鷄場，寧可花錢去買信用可靠的種蛋，自己拿回家用母鷄孵化，比較保險。

(6)飼料最好由自己攪拌調配，因購買原料，可以即刻發覺品質優劣，同時又可以配合平衡標準飼料。

(7)鷄舍建造，和飼養設備，一定要合標準，如何通風避濕，最要講究。地面鋪好鋪水泥。

(8)病鷄廢鷄要捨得淘汰，清潔衛生第一，多跟當地畜牧獸醫聯絡。

註：本文作者編印「如何養鷄」一書，請參看本期分類廣告。





，多音噪展發上世⑥
，的家公會社念帶
，家大為噪用善
。勢好正靜安活生

，哮踏踏車汽共公⑤
，走吧吧車軍、車卡
，(開不避)賢無若避閃路行
。(死輾)較車乎着煞命一

，叫哺哺車汽小大④
，着株株車局路公
，搖會路英凸(塵灰)粉土
。礁碍眞着英(睛眼)瞷目