

山坡地種苧麻

賴銘立

。甘蔗葉及花生蔓也可以。蓋草也應依山坡傾斜地勢橫蓋。

五、留意除草整株

① 萌芽後一個月以內，苗高約二十公分時，即應拔除株間雜

一、適當的坡地

坡度在三十度以內的雜木林地，砍伐後改種苧麻較適宜。過陡的山坡地，仍宜造林。如利用竹類或栽培香蕉的坡地，來種植苧麻，尤為適宜。假如要利用茅草地栽培苧麻，在栽種前每公頃應施用一千二百公斤以上的石灰，中和土壤的酸性。

二、合理的開墾

① 本省中南部山地，宜在九月雨季後乾燥時，

將林木或香蕉竹類砍伐。凋葉樹木，樹根可留在土內，用斧頭開闢殘餘樹幹，使在雨季後腐爛。

② 收集曬乾零星樹枝及雜草，堆積放火燒毀，但是必須注意防火，以免引起森林火災。

③ 開墾後土壤膨脹時，就可栽種苧麻。

④ 假如土地堅硬時，需要等到降雨後，依等高線順次深耕至四、五寸，碎土後栽種。

三、注意水土保持

山坡地栽培苧麻，要注意水土保持：① 設置等高牆：先測定坡度，利用石頭、樹枝等，按等高線分段設置石牆，牆高約二尺左右，牆頂應平。

② 開闢排水溝：普通的排水溝，應沿傾斜方向直角設置，溝寬約一尺，深四至五寸，坡地頂上開橫溝一條，中部高，兩端低，以便水向兩側排除。下面依次隔五至十公尺開橫溝一條，自然排水地區另闢直溝，溝底宜砌石頭或種草。

③ 等高線栽培：按等高線栽培苧麻，山坡地上的大石頭，應該保留。

④ 設置防風林：山頂樹木不可砍伐，風力強的方向，應保留防風林。

四、適時種植

① 種植時期，以雨季末期至第二年雨季前為宜，本省中南部為九月至翌年五月上旬。

② 種植溝寬二至三寸，深五至六寸，行距一尺半，株距一尺，每穴種葉芽苗二枝。橫種，種後覆土一、二寸。

③ 山地栽培苧麻的覆蓋物，用茅草及綠肥最好

草。第二期除草在施肥前舉行。

② 雨期來臨前半月，即應整株。齊地割平，注意切不可傷及地下麻株。整株後應即施肥。

六、預防蟲鳥獸害

① 山地苧麻蟲害，以捲葉螟蟲及蛾眉蛭蝶幼蟲最普遍。應噴一·五% BHC 粉劑預防。無噴粉器時，可用竹竿懸一紗布袋，內裝藥粉，在清晨露水乾後施用（左圖）。用二十五% DDT 乳劑，調合四百倍水噴施，效果也很好。同時摘除被害葉，集中焚毀。

② 防治蝸牛，可在麻園周圍多撒氫氮化鈣，清除麻園雜草，或清晨人工捕殺。

③ 山豬等野獸，可在麻園周圍設置荊棘或刺樹防治。也可以用毒餌毒殺。

夜間可試用「爆竹驚鳥器」

防除野獸


為害（請

看本刊九

卷二十二

期第十六

頁）



(形情的撒噴藥裝袋布紗用)



(賴學的好良長生上地坡山)