


阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔



注意預防馬鈴薯病蟲

— 林 昭 雄 —

在本省栽培馬鈴薯，收益很好。

但是馬鈴薯的病蟲害很多，因而影響農友們種植馬鈴薯的信心。

施行輪作，精選種薯，消毒種薯，採用塊莖單位栽植等，都是防治馬鈴薯病蟲害的有效方法，除此，在生育期間，還需要注意下列的幾點：

(1) 生育期間，多巡視田間，假如發現有毒素病（包括捲葉病、縮葉病、條斑嵌紋病，或激烈的黑瘧病），應立即掘起燒燬，或埋入深穴，以免蔓延。生育後期，如看見輪腐病等病株，應即拔除。在生育後期，或收穫適期前所拔却的病株馬鈴薯，可供食用或澱粉加工用，所以，有嫌疑的病株，應全部拔取。

(2) 盡力撒佈藥劑，尤其連日下細雨，多霧多露時，要特別注意。噴射「大生」四百倍液，或六斗式、四斗式「石灰波爾多液」，都可預防疫病、夏疫病發生。噴藥時，注意葉子正背兩面都噴到。又瘡痂病與黑瘧病的發生，與土壤鹼性有關



捲葉病病葉(上)與瘡痂病病薯(下)

蟲。

蚜蟲為傳播毒素病的主要媒介，所以要徹底消滅蚜蟲。又附近有茄科、十字花科等蚜蟲寄生植物，也需要徹底除去。

(生育期間應多巡視田間)

係；如土壤呈酸性，瘡痂病就減少，如施草木灰、石灰或鹼性肥料過多時，就發生得多。

黑瘧病與瘡痂病正相反，所以，黑瘧病可撒佈石灰來減少病害。

(3) 噴射PM乳劑一千倍液，或「混合魚藤精乳劑」八百倍液，或DDT乳劑五百倍液，以防二星大瓢蟲(オホニジユウヤホシテントウ蟲)與蚜

