



開端用子万阿花仔

阿英仔圖



蔬菜種子必需消毒！

王進生



一、種子傳染病害

由種子傳染的主要蔬菜病害如下：

蘿蔔：黑斑病，炭疽病，黑腐病。甘藍：根朽病。瓜類：炭疽病，西瓜蔓割病。

番茄：疫病，葉枯病。芹菜萇薆：葉枯病。菜豆：炭疽病，葉燒病，銹病。豌豆：黑斑病，褐斑病。

馬鈴薯：瘡痂病，黑痣病，疫病。薑：腐敗病。

二、常用的消毒藥劑

種子消毒劑，用粉劑較液劑方便，藥害也較少。

種子消毒用主要藥劑如下：

阿拉散

粉紅色的微細粉末。對人畜有毒必需

注意。使用量為種子重的〇·五至一·〇%，作種子。對人畜有毒，必需注意。使用量為種子重量的〇·四%。可預防茄科、豆科及瓜類的立枯病。須貯藏於乾燥且冷暗的場所。

西樂生 赤褐色的微細粉末，只能消毒乾燥的種子。黃色的鱗狀結晶粉末。不要與鹼性藥劑混合。有粉劑與水和劑兩種。豆類應使用粉劑，使用量為種子重量的〇·三至〇·五%。水和劑適於消毒球根類。作為二百二十倍的溶液，將種苗浸漬一至二小時。

亞氯化銅

紅磚色較重的粉末。假如已變成黑