

！甜變以可萄葡種酸

——生石徐 里苗中鎮栗苗——



友農生石徐

看主枝情形而定。嫁接步驟如下：

選切砧木 選定主枝四條至五條，在同樣高度，節上大約一合寸的地方，剪去尾部。其他各枝全部剪去。然後用銳利的士林刀，將砧頭垂直切下；直徑五台分以下的砧頭，等破成兩半；一合寸以上的，偏一邊切下（圖一）。都切到節為止。節上的芽，要順手削去。

選削接穗 選擇優良品種的結果母枝，節間較短，芽目豐滿，內容充實的，採取接穗。將該枝切斷，留一節至二節做為接穗。接穗下端，削成斧形，切面長八台分至一合寸，坡度三十度以下。削穗最要技術，要一削就使成功，斧形左右厚薄均一，切口光滑，才能與砧木切口密接。（圖二）

嫁接 削好接穗後，插入砧木切口，使皮部與皮部相接。接穗斧形部份，要全部插入，使先端到底。大的砧木插入二支接穗，然後用繩縛緊，包紮筒壳，內部填入河沙。用塑膠袋密封後，再用筒壳遮蓋，最為安全。

管理 砧木上如有新芽發生，應即除去。沙內要時常灌水，以免接穗枯乾。如用塑膠袋密封時，等接穗發芽長寸餘時，切開塑膠袋上面封口。


注意事項

①立春起約二十日

間，為嫁接最適時期（即二月五日起二十五日止。）剪枝後樹液會溢流就過遲了。②從外頭剪來的接穗，施行消毒後，用塑膠袋密封，放在陰涼地方或埋藏潤沙內保存。③棚上殘存的老枝，要拖下燒却，同時消毒棚架，以免病害傳染。④一年後，新枝長滿棚架，應在春夏之間，作適當之摘心及誘引。

臺灣各地早年所栽的葡萄，大部分都是酸種果實，在市面上很難銷售。這種酸種葡萄，可以按照下法改接甜種。

酸種葡萄的主幹，大多已經過老而且粗大，不適於嫁接。因此，應選數條主枝，施行嫁接。嫁接位置，在棚上、棚下或棚際，



中農化五廠出品 4大農藥



巴拉松乳劑

採用西德拜耳藥廠原料製造

PM乳劑 巴拉松 混合乳劑

防治水稻螟蟲其他作物害蟲

馬拉松乳劑

防治蔬菜菓樹害蟲極具效力

魚藤精 混合乳劑

藥害低防治蔬菜菓樹茶樹害蟲

總公司：台北市南陽街廿一號 電話三一六六〇 五廠台北縣景美鎮萬隆里

經銷處

- ①臺中縣霧峯鄉中正路 274 號 正豐農藥行
- ②雲林縣虎尾鎮光復路 48 號 惠豐農業資材行
- ③臺南市公園路 173 號 蓬萊農業資材行
- ④屏東市長春里民生路 86 號 和豐米廠
- ⑤臺北市漢口街一段 23 號 大豐農藥公司
- ⑥新竹市東門街 73 號 大豐行
- ⑦臺北市永樂市場內 蓬萊農產行
- ⑧豐原鎮中山路 10 號之 34 資豐年供應行
- ⑨桃園縣新屋鄉新生村 建德米行
- ⑩臺東鎮中華路 219 號 永發農機行