

怎樣選得椰子好種實

康瀚

一株椰子的平均壽命約八十年，栽植十五年以後，才能知道這株椰子的性質是否優良，所以在椰子育苗造林之前，要很慎重的選擇母樹種實，才可以得到最大的收益。

一、優良的母樹

臺灣現植的椰子，是從南洋各地引進的，品系很雜，很

離根據固定的特徵選種。但一般講來，在有多數優良品種椰子的產區，選擇適當的母樹與種實，種植成長以後，大概不致

過差。

優良的母樹

樹幹圓直，樹葉茂密，葉形巨大，葉色濃綠。同時要注意樹勢健壯，花梗粗短，沒有下墜的傾向。椰果的大小適中，果形圓滿的，通常結實較多，椰肉也比較厚。

凡是結實空心，或在成熟前容易落果的椰樹，不適宜選做母樹。

二、健壯的種實

在春末夏初成熟的椰實，發芽率最高，育成的種苗也比較健旺。選做育苗的種實，必需充份成熟後才可以採摘，但也不可以過熟，以致乾腐。充份成熟的椰實，外果皮棕黃色或深綠色，含水量較少。有經驗的人可以用手指輕彈果實，判斷是否成熟。或用手搖動果實，沒有成熟的聲音重濁，已成熟的聲音清晰。

每束椰果的基部及頂端的椰實，及果皮有裂縫的，都不

適宜做種實。外果皮較薄的椰果，果肉比較厚。果皮的厚薄，可以用小刀插入試驗。凡是椰子水已乾或是果肉疏鬆的果實，都不可用做種實。

三、椰實的處理

採摘椰子種實時，應該將椰果整束割下，用粗的繩索縛好，慢慢吊下。或在樹上選擇黃熟果實，小心摘取，裝入布袋或竹籃中，輕輕傳下。或在樹下張網承受，切不可由樹上拋擲地下，使種實破裂。

種椰採集後，堆放於陰涼透風處約一個月，使椰子外殼在下種前充分乾燥，以免霉爛。在乾燥地區，備藏過久，或久曝於日光下，椰子過度乾燥，椰殼內乳水消失，椰肉與肉殼脫離，搖動時作沙沙響聲。這種椰實，不能發芽，所以不適於做種之用。

種實如需運輸到遠方時，要在完全成熟以前採集，否則會在運輸中途發芽。發芽後如稍乾燥，就會枯萎。

為防種實乾燥，宜用細砂密藏，不可暴露空中。先在室內地面上，鋪細砂一層，約三寸厚，然後將椰實平放在上面

珍貴高麗參

四林場試種

省林產管理局陶玉田局長，最近訪問韓國歸來，帶了新鮮的高麗參種子六百零四粒，分在臺中山林管理所的環山林場、八仙山林場、阿里山林場及太平山林場等地試種。

高麗參是一種多年生植物，主產在韓國漢城、我國吉林省、日本福島、長野、島根等地。喜寒冷高燥氣候，及砂質壤土。苗木育苗後，翌春移植於本田，五、六年後始可採收，忌連作。

高麗參的根部，收穫後經加工調製後，是很珍貴的補品。

再用沙將椰實全部密蓋。如種實過多時，可照此法逐層堆積，等到需要下種時，將椰實自沙堆中取出。如有果皮霉爛，椰水乾燥時，或搖動時沙沙作響的，一律棄去不要。若處理得法，椰實的發芽力，可以保持三年之久。



圖苗子椰的椰埔內縣東屏在置設

(攝和福巴)