



安哥拉山羊與台灣羊交配成功雜種毛用羊

毛用羊及肉用牛

安哥拉山羊出生後一年即可剪毛，每年可剪一、二次，繼續產毛五、六年後即可肥育。

安哥拉山羊與臺灣山羊級進繁殖三代以後，羊毛品質良好，每年每頭約產毛三、四磅，肥育後產肉成數約四十五%。生長十二個月的種公羊及十個月的種母羊，可以配種，懷孕五個月後生產。

橫貫公路沿線在海拔一千至二千公尺，溫度在攝氏十二度至十八度最適宜牛羊生長，可以試養安哥拉山羊。

雜交第一代安哥拉羊繁殖率一百—一百二十%

，易患腺麻痺症、肝蛭、胃蟲、蛔蟲等。

種公羊一頭，自由交配可配五十—八十頭，管割交配可配五十到六十頭。如青羊十頭，有天然牧草及灌木叢地區，需植木本科豆科牧草一公頃以上。種羊及肥育羊，如有豆科牧草，一般情形中不要再加精飼料。多年生豆科牧草，以葛藤較佳，種後八個月即可收穫。

安哥拉山羊的羊毛，中本紡織公司收購，目前市價每磅約六十元。生羊皮目前無銷路，以後產量增加，可由本省製皮皮革業收購。

選購本省產雜交用山羊，應注意體型寬大深厚正常，精神飽滿，黑毛而有光澤者。

臺灣大學現飼的肉用種牛是 Brown swiss。現在尚無本省產母牛與肉用種公牛雜交所產之小牛。

省產牛種中也有適於肉用者，較本地黃牛種為優，其產肉成數約為四十五%。橫貫公路沿線，以雪崗、勝光等處最適飼養毛用羊及肉用牛。(清卿)

狼尾草

狼尾草(納比亞草 Napier Grass)是在熱帶地區最普遍被採用的牧草之一種，其產量可以由多施氮肥及延長刈割間隔時期來增加。但是刈割時期間隔過長時，草的品質可能因此變劣。

美國農部與「波多黎哥」大學農事試驗場合作研究的結果，發現狼尾草的生長，與施肥量、收割時期，以及土壤的酸度有密切的關係。

由連續三年的試驗結果知道，最好的肥料配合為每年每公頃施用氮肥一千公斤，最好的收割次數為每隔六十天刈割一次。在這種情況下，狼尾草每年每公頃生產乾物量約四萬五千公斤(約三十噸生草)，蛋白質含量平均百分之九·七。這個產量，可飼育成牛十五頭以上。(增輝)

酬謝本刊長期訂戶，

贈送農業書籍

期滿訂戶請速續訂，每戶贈送一冊
未訂農友請速訂閱，每戶贈送一冊

本刊為慶祝農會改選，並鼓勵有關單位及農友踴躍訂閱起見，特贈送名貴之農業書籍給予訂戶，辦法如左：

一、期間：自本年三月一日起至四月三十日止(郵戳為憑)
二、贈送對象：凡在上列期間續訂或新訂本刊的全年及半年訂戶，均贈送一冊。

三、贈送書籍：「家畜和家禽」(簡稱甲)，「種稻和養魚」(乙)，「土壤和肥料」(丙)。

四、注意：①請訂戶任選其中一種，以甲、乙或丙記號註明於匯款單反面通信欄內，本社當即將所選書籍寄上，但如所選書籍送完，本刊得以其他書籍代替贈送。



②請農友們趕緊到郵局(郵政代辦所)匯款訂閱，或將訂款送至附近農會訂閱(匯款手續費本社負擔)。

豐年社啟

出售晚崙西亞甜橙苗木啟事

本園承臺東區農林改良場技術指導，負責繁殖「晚崙西亞甜橙」純正苗木，品種來源可靠，如需上項苗木，可向本園洽購。

東平農園謹啟

地址：臺東縣卑南鄉初鹿村水源頭廿八號