

李·梅·梨

臺東境內海拔三百五十至四百公尺的山地，假如土層深厚，土質不太黏重，可以栽培李、梅或梨。

李子的優良品種有「黃柑李」、「花螺李」、「紅肉內李」三種。梅子可栽「大果種」。梨可選種「橫山中生梨」。李子往往同品種不能受粉，必須多數品種混植，才能大量結果。

修剪整枝宜採杯狀整枝。把上年生發育枝或長果枝留四十一五十公分修剪，短果枝除密生者疏刪外，一概不修剪。

梅子的修剪法與李子一樣。梅的樹幹及主枝常大量發生徒長枝，使樹冠過密，宜在發生初期去除。在夏季對尚在繼續生長的枝梢施行摘心，使組織充實，形成花芽。

梨宜採棚架整枝，種植後一年，在離地一·八公尺處剪截，使萌生四個主枝，向四方水平伸展，縛於棚面。修剪宜採疏刪修剪，祇把直立枝和日蔭枝除去，側枝除過密處酌量刪剪外，都應保留，使早日完成樹形。

◁種菜送贈▷


「鳳山青早生」贈送彰化及以南讀者試種，得到種子的讀者，有向本社報告栽培結果的義務。「臺北二號」贈送臺中及以北讀者供採種栽培之用，得到種子的讀者，請採種後贈送本社指定的其他農友。

對上項試種及採種栽培有興趣的農友，請按照下列次序來信索取：①準備較厚的信封，在這信封上寫好本人的姓名與住址，並貼郵票四角。②寫好本人姓名住址的信封，再裝在另外一個信封裡。③封好貼郵票後寄「臺北市中山北路二段四十三號豐年社收」，請在信封正面註明「毛豆」或「菜豆」二字。

以上地區的限制，是因為種子的區域適應不同，種子的數量也有限，請讀者原諒！收到來信後，先到先送，送完為止，不再覆信。

- 一、「鳳山青早生」毛豆 一千份，每份二十公分
- 二、「臺北二號」矮生菜豆 六百分，每份五十粒

山梨橫 一年 收穫 二次 第一次 在五 月下 旬到 六月 中旬 (十 月) 開花 間開 花) 新春 大獲 庚子春少破



如何減少子豬發生

白痢病？

各位農友！出生不久（約三星期內）的子豬很容易患白痢（放乳屎），原因是很多，尤其是母豬子豬飼料中欠之礦物質所引起母豬子豬患貧血子豬下白痢也是很多。

豬安寧命 是礦物質綜合製劑，對於母豬子豬貧血及豫防子豬白痢及子豬肺炎等有卓越功效。

母豬配種後喂食

豬安寧命

也有左記效能

- ◎產前產後便秘、補胎安胎
- ◎豬胎平均健全、發育按期生產
- ◎產後增進食慾（不會儉省）
- ◎奶之分泌旺盛
- ◎子豬元氣肥胖活潑毛草光澤

鴻春家畜藥物廠

臺北縣板橋鎮長安18號之6 郵政劃撥儲金第三八一號