


忠實的耕牛·農家的汽車

## 嘉禾牌K-3型耕耘機

優點：



- ①裝有齒輪變速機
- ②前進後退自由
- ③機身構造堅固
- ④汽油柴油引擎均可使用
- ⑤操作簡便
- ⑥可向土地銀行、合作金庫及農會貸款

△函索即寄

詳細說明書△

振豐鐵工廠榮譽出品

廠址：中壢鎮建國路三九號（電話中壢三一七轉呼）  
連絡處：臺北市重慶北路二段四號宏商行農機部  
臺中市建國路一一四號國華電器廠

請全省獸醫師養豬養鷄業者注意！

**阿司卡利肯** (Ascariken)  
蟲藥之王

(內藥登字第一四六四號)

「適應症」**豬、鷄之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症**

**公認最安全有效**  
①比效力強大一倍蟲力減去百分之九十五以上。  
②比絕無副作用。  
③用法簡單，投藥前不須絕食，服後不須使用。

價格最廉——**一頭一元，成鷄一隻僅五分**代  
價可獲數百倍利益。

**注意：**「**阿司卡利肯**」添加飼料時，**飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料裡**。（會

囑咐）

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理  
**臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司**

臺北市信義路二段一二〇號

●各種優良農藥現貨供應  
裕米農乳劑、錠劑、伏微能乳劑錠劑、新美裕、錠劑、飛突遇新

慶祝農民節

特製農業資材公司  
馬拉松、山女特靈、大利農、新殺卵、砒酸鉛、軟蛭倒爾、ネマヒユム30、巴拉松乳劑等

手冊附成本費二元（郵票農藥詳細說明書函索即寄本公司之經常顧客業已寄回尚未收到者請來函再補）

專營農業生產資材貿易公司

臺北市九段八十六號  
電話四四二五三·四二三六五  
地址臺灣省新竹縣

# 信 箱

預防葡萄銹病

應用「大生七八」

中部苦瓜播種

春季二至三月

一星期撒佈一次，繼續三—四次者，可以預防其發生。（洪章訓）

葉的背面起紅點，漸漸變枯黃。最初發現僅數點，現在已蔓延至全面，用DDT粉以水溶液噴霧仍無效。附送一些藥，請惠予解答下列各點為盼。一、叫做甚麼病？二、其原因？三、使用甚麼農藥才有效？（屏東縣竹田鄉王瑞琳）

【答】：你所栽培之葡萄發生之病害係保病，對此病施用DDT粉是不能防治的。應使用殺菌劑大生七八（濃度為四百倍）液，未發生或剛開始發生時施藥，然後每隔

？微酸性之粘質壤土是否適宜種植苦瓜？二、苦瓜直播之行距株距約多少距離？三、苦瓜生育期中容易發生之病蟲害，及其防治方法？四、苦瓜對於三要素之需要量及其施肥方法為何？五、苦瓜收穫後之空地利用它

，種植夏至番茄是否適宜？（南投縣名間鄉吳爾祥）

【答】：我種有一株葡萄，自撒個月前起葉的背面起紅點，漸漸變枯黃。最初發現僅數點，現在已蔓延至全面，用DDT粉以水溶液噴霧仍無效。附送一些藥，請惠予解答下列各點為盼。一、叫做甚麼病？二、其原因？三、使用甚麼農藥才有效？（屏東縣竹田鄉王瑞琳）

【答】：你所栽培之葡萄發生之病害係保病，對此病施用DDT粉是不能防治的。應使用殺菌劑大生七八（濃度為四百倍）液，未發生或剛開始發生時施藥，然後每隔

至九月及春季二至三月。土壤以肥沃的砂質地最好，但只要排水良好，日照充足，灌水方便之地無論什麼土壤都可栽培成功。微鹼性土壤宜施石灰後栽植。二、苦瓜直播為畦潤一百五十公分，株間六十公分較理想，過於密植時因日照不足，通風不佳而容易患病。三、苦瓜生育期中之病害為炭疽病及白粉病最為嚴重。前者用大生加水四百倍，後者用利生加水八百倍防治。蟲害最嚴重者為瓜寶蛆之為害，前者用開花結果前用果蠅誘殺劑（可溶性蛋白質與二五%可濕性馬拉松粉劑，市面有售）防治。害蟲均可用馬拉松防治。

四、苦瓜之肥料以氣肥為主，鉀肥次之，化肥可少施。三要素之需要量因土壤的不同而有差別，但普遍每十公頃地以氮肥二十公斤，鉀肥十五公斤，磷肥六公斤左右為標準。肥料最好用有機質肥料，基肥多施堆肥及草木灰，追肥最好每十至十五天左右施肥一次，猪糞尿。五、苦瓜收穫之土地可栽培番茄，

（陳文德）

檸檬在屏東可生長

以尤力加品種較佳

【問】：一、本省南部屏東地區，海拔百公尺的地方能種檸檬？二、檸檬的苗何處有售，在南部雨季之前，五、六月間能買到麼？三、要是園藝試驗所的苗，須用申請的手續麼？私人能否直接購買？四、檸檬以何種品種最佳？五、檸檬的栽培法？能擇要見告否？（屏東縣春日鄉劉化之）

【答】：一、在屏東海拔四百公尺的山地，論氣溫，檸檬可以生長，但還須注意方向、溫度、陰影等，檸檬喜陽光充足，排水良好，土層深厚之地，氣候要乾燥，在多雨或多濕之地栽培檸檬，發育徒長而病蟲害發生多。

二、檸檬苗可向彰化縣永靖鄉一帶苗圃商購買，檸檬最好在休眠期定植，即十一月至一月間，雨季定植，發育較差。

三、試驗所繁殖的種苗，數量有限，事

供栽作母本之用，無法多量供應，私人可以申請購買（用私函），或逕自前往接洽購買亦可。

四、檸檬以尤利加（Eureka）品種較佳

，因為它是四季結實的，獲利較厚。

【本省適合栽種嗎？】一文。（蔡致謨）

## 柑橘落果原因不一

【問】：我家栽植柑桔四百株，由於管理的週到，病蟲害防治的澈底，是故生長得非常好的。今年已是種後的第七年了，不知何故，結成之果，竟百分之八十落到地下，所剩餘者，寥寥無幾，其原因何在？補救防治的方法如何？請回答告示。（新竹縣橫山鄉陳先生）

【答】：①風害，②施用過量氮肥，③根部受機械傷害，④根部腐爛，⑤噴佈之藥劑發生藥害。以上五種原因皆能引起落果。

看你的管理方法略述，可能是施用氮肥過多，或者是噴佈夏油乳劑引起藥害，如果是藥害，葉片上應該有斑點發生。（蔡致謨）

## 菠菜播種應在適期

【問】：菠菜是否有雌雄之分？如有的話，怎樣分辨？它的栽培期間，最早在幾月能栽培？（彰化縣埔鹽鄉陳大漢）

【答】：○菠菜的播種期普通自九月至翌

年三月，但九月至十二月播種者收量最多，

品質亦最好。一月至三月播種者，本地種因日照時間較長的關係，抽苔較快，產量和品質均不理想，故應選播者較晚的外國品種栽培。四月至八月因高溫和日照強烈的關係，種子發芽不良，且病蟲害多，生長不良，栽培困難。○菠菜有雄株，雌株及兩性株等三種植株。雄株普通抽苔開花較快，株形葉片較小，株上只有雄蕊，不能結子；雌株普通抽苔開花較晚，株形葉片較大，株上只有雌蕊，需要雄株或兩性株之雄蕊授粉後才能結果子。兩性株之株形普通近似雌株，但株上有

株使其結子；故採種時應將雄株拔除，只留雌株和兩性株，才能提高種子產量和品質。

（陳文郁）

## 西洋小蘿蔔四季可播種

【問】：查農年曆書，有載「臺灣蔬菜種子臺北與農種子行有售」，本省四季均可播種。播種前栽培地多施腐熟堆肥，用撒播或條播均可，株距為六公分左右，肥料施化學肥料（因爲生食可用施人糞尿不衛生）。生育期間注意心蟲及野蟲。播種後二十至二十五天採收，過期根球空心品質不佳。「球重量約十公分左右爲上品。市面銷路尚佳，去年在臺南一臺斤，約三元五角左右。（陳文郁）

【答】：西洋小蘿蔔又稱爲櫻桃蘿蔔。種子臺北與農種子行有售，本省四季均可播種。播種前栽培地多施腐熟堆肥，用撒播或條播均可，株距爲六公分左右，肥料施化學肥料（因爲生食可用施人糞尿不衛生）。生育期間注意心蟲及野蟲。播種後二十至二十五天採收，過期根球空心品質不佳。「球重量約十公分左右爲上品。市面銷路尚佳，去年在臺南一臺斤，約三元五角左右。（陳文郁）

## 花生結實不佳連作缺乏要素

【問】：我每年所種花生，開花後能結實者僅及花的半數，其餘一半，只有一條根在地下，沒有成莢，這是欠缺什麼？怎樣才能補救？（彰化縣芳苑鄉林進成）

【答】：花生結實不佳，乃因連作缺乏「微量元素」，並培土不妥。可先試用，硫黃、錳、苦土三項，每分地施下各三臺斤。（余慶東）

## 雜種鷄供應用種生長較快

【問】：想養雜種肉鷄，請問那種鷄與那種鷄雜交，比較好養及生長比較快？普通麻雞開鷄雜交，其種類怎麼？在飼養時期，花鷄開鷄雜交，那個期間比較適當？是否冬季比較好？肉質那種比較好些？（屏東縣竹田鄉陳傳富）

【答】：利用雜種鷄供應用，以兼用種

如蘇花、洛島紅、紐漢西等互相雜交者生長較快。應用普通廣花雞與開鷄雜交，結果亦比較與其他本地鷄之成績爲佳。不管任何種家禽，在國曆十二月至翌年四月間孵化飼養

的週到，病蟲害防治的澈底，是故生長得非常好的。今年已是種後的第七年了，不知何故，結成之果，竟百分之八十落到地下，所剩餘者，寥寥無幾，其原因何在？補救防治的方法如何？請回答告示。（新竹縣橫山鄉陳先生）

【答】：①風害，②施用過量氮肥，③根部受機械傷害，④根部腐爛，⑤噴佈之藥劑發生藥害。以上五種原因皆能引起落果。

## 裕隆機器製造股份有限公司

YUE LOONG ENGINEERING CO., LTD.  
(線四)四三四一三：電話 號六十街陽信市北臺：址地公司  
六五·四五 店新：電話 林坪大鎮店新縣北臺：址地廠工



YLN-701型四門小轎車

### 主要產品

- (1) YLN-1型吉普式小汽車  
(2) YLN-2型加大客貨兩用車  
(3) YLN-1型五頓半載貨車  
(4) YLN-3型一頓半載貨車  
(5) YLN-4型旅行車  
(6) YLN-502 RB型柴油大客車  
YLN-701型四門省油小轎車  
各型汽車活塞、活塞銷、活塞環、汽車套筒、彈簧鋼板、零  
件、各型齒輪、各型精密機件

◆ 賽 頭 歡迎

## 世間藥病治療肺散

肺癆、吐血、止咳嗽、淡黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可印台衛成字第六七一號

## 香港腳專門治療藥出現



(四八)北市衛四廣檢字  
第四〇五九號

腳濕靈 治氣久病 不擦後門治療  
為腳趾濕氣病 治療內政部許可台衛成字第三七三號

各地藥房均售  
各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號  
明書函路三段二四二號  
臺北市慶重明說  
景新製藥所出品

# 机音擴提手



一千尺——二千尺間傳話清楚

式樣美觀  
攜帶輕便

每具  
推廣特價  
二千二百元

(使用普通  
乾電池)  
(隨地皆可購得)

作業時：傳話，聯絡，指揮之實用

適合：農場、耕地、林班等

總經銷 義昌隆

臺北市中山北路一段二十九號

電話：四二四二四

，其生長均較其他季節為優，肉質亦以兼用種互相雜交者為佳。（李登元）

## 預防草魚病

### 減少放養數量

七月左右，草魚苗一十二斤的病死甚多。其病症為，剖開現死之草魚一看其腹部已成爛爛狀態，而病死魚除草魚外，其他魚則別無異狀。請問草魚之病死原因及其病名與治療方法如何？（臺南縣柳營鄉黃得勝）

【答】：你所說草魚所患的病是「荷疾」或叫「瘌疾」（Dysentery），這是草魚所常害的病。這種病的病原菌尚未分離成功，也沒有有效的治療法。不過有效的預防法是減少放養數量，使其自然抗病力增加。（唐允安）

【問】：敝家宅前有魚池八分，每年六、七月份水草。（唐允安）

【答】：一、本校繁殖金魚雖稍有成就，但剛孵出小魚苗的飼料尚有疑問，請指教。

二、如何採取下水磚泥中極微小的蚯蚓方法

（如頭髮大的小蚯蚓混在泥土中用何方法分離，除去泥土及雜物）。（花蓮縣鳳林國民

學校戴文鑑）

【答】：一、剛孵化的小金魚，最好飼淡

水魚池中（浮游在水中的）一種小甲殼類蟲

俗叫「水蚤」，日文名「ミヅシコ」。這種

小蟲，可用繖密的網兜在水中反復捕撈。二

、要採取水生蚯蚓，可將含該蚯蚓的土取

出，放在用銅絲網製的篩子篩過，然後放入

白質盤中，將雜物除掉即可。（唐允安）

北市建國北路路田海缸）

【答】：並不完全是未受精卵。產出卵黏着成塊者，多沈於水底。此種卵孵化率很低。改良方法，最好當產卵期，在牛蛙池中多

植水草。（唐允安）

【問】：小金魚飼料

最好 是 水 蛋

【答】：一、本校繁殖金魚雖稍有成就，但剛孵出小魚苗的飼料尚有疑問，請指教。

二、如何採取下水磚泥中極微小的蚯蚓方法

（如頭髮大的小蚯蚓混在泥土中用何方法分離，除去泥土及雜物）。（花蓮縣鳳林國民

學校戴文鑑）

【答】：一、剛孵化的小金魚，最好飼淡

水魚池中（浮游在水中的）一種小甲殼類蟲

俗叫「水蚤」，日文名「ミヅシコ」。這種

小蟲，可用繖密的網兜在水中反復捕撈。二

、要採取水生蚯蚓，可將含該蚯蚓的土取

出，放在用銅絲網製的篩子篩過，然後放入

白質盤中，將雜物除掉即可。（唐允安）

農友們！種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種類，若選錯品種種植者，就是一生的錯誤。第三、一來費精神，二來了本錢。三來鎮土地。

各位農友們！如希望種植荔枝，若無氣憊者，即請撥駕來敝園參觀指教、無任歡迎。臺中縣酒子鄉頭厝山中路十號

林永旭荔枝苗本園

對於顧客  
優待辦法  
請看豐年

第九卷一  
、二、三  
期敝園之  
廣告



荔枝苗現有尺數  
4 3 2 尺  
上 上 上  
下 下 下  
5 尺  
上 上 上  
下 下 下  
7 6 尺  
上 上 上  
下 下 下  
9 8 尺  
上 上 上  
下 下 下  
10 9 尺  
上 上 上  
下 下 下  
以上

① 最新式六馬力半五型牽引式美利鐵牛

美國最出名，最省油最合農業機械的引擎，耕耘機如脫穀機（機器桶）抽水機、運搬車等用途甚多、

新貨已到，即日起交現貨，舊貨不多

先訂為先，歡迎迅速訂購，勿失良機。

② 各馬力克林頓引擎

現貨九馬力半、七馬力、四馬力、

三馬力、二馬力半、

△ 汽油、煤油、柴油均可用各馬力、

貸款方法：向土地銀行、合作金庫、

糧食局等均可申請

說明書、目錄函索即奉寄

臺灣總代理 巨豐行

臺北市昆明街一九號

電話：三〇二九二

## 爲「大生」及「可利生」商標專用權啓事

本公司總代理美國羅門哈斯公司（Rohm & Haas Co.），曾在本省銷售該公司「大生」及「可利生」商標農藥，並經李澤民律師在經濟部中央標準局辦妥商標註冊在案。除與本公司有特約者，

無論是否改裝，均不得使用該商標。如有侵害「大生」及「可利生」商標權益者定當依法追究，請各界注意為幸。此啓。

民國四十九年二月一日

青象貿易有限公司謹啓