

供栽作母本之用，無法多量供應，私人可以申請購買(用私函)，或逕自前往接洽購買亦可。

四、檸檬以尤利加(Eureka)品種較佳，因為它是四季結實的，獲利較厚。

五、檸檬的栽培法請參閱歷年七卷四期「本省適合栽檸檬嗎？」一文。(蔡致讓)

柑橘落果原因不一

原因不一

【問】：我家栽種柑桔四百株，由於管理的週到，病蟲害防治的徹底，是故生長得非尋常的好。今年已是種後的第七年了，不知何故，結成之果，竟百分之八十落到地下，所剩餘者，寥寥無幾，其原因何在？補救防治的方法如何？請同音告示。(新竹縣橫山鄉陳月生)

【答】：①風害，②施用過量氮肥，③根部受機械傷害，④根部腐爛，⑤噴佈之藥劑發生藥害。以上五種原因皆能引起落果。

看你的管理方法略述，可能是施用氮肥過多，或者是噴佈夏油劑引起藥害，如果是藥害，葉片上應該有斑點發生。(蔡致讓)

菠菜播種在適期

【問】：菠菜是否有雌雄之分？如有的話，怎樣分辨？它的栽培期間，最早在幾月能栽培？(彰化縣埔鹽鄉陳大漢)

【答】：①菠菜的播種期普通自九月至翌年三月，但九月至十二月播種者收量最多，品質亦最好。一月至三月播種者，本地種因日照時間較長的關係，抽苔較快，產量及品質均不理想，故應選抽苔較晚的外國品種栽培。四月至八月因高溫和日照強烈的關係，種子發芽不良，且病蟲害多，生長不良，栽培困難。②菠菜有雌株，雌株及兩性株等三種植株。雌株普通抽苔開花較快，株形葉片較小，株上只有雌蕊，不能結子；雌株普通抽苔開花較晚，株形葉片較大，株上只有雌蕊，需要雌株或兩性株之雄蕊授粉後才能結子。兩性株之株形普通近似雌株，但株上有雌蕊和雄蕊，自己可授粉結子，亦可授粉雌

株使其結子；故採種時應將雌株拔除，只留雌株和兩性株，才能提高種子產量和品質。(陳文郁)

西洋小蘿蔔

四季可播種

【問】：查農年曆書，有載「臺灣蔬菜種植收穫時期表」內有「西洋小蘿蔔」。鄙人擬欲栽培，敬祈貴社惠賜指導。(桃園縣小大滴蘭金生)

【答】：西洋小蘿蔔又稱為櫻桃蘿蔔。種子臺北興農種子行有售，本省四季均可播種。播種前栽培地多施腐熟堆肥，用撒播或條播均可，株距為六公分左右，肥料施化學肥料(因為生食用施人糞尿不衛生)。生育期間注意蟲及蚜蟲。播種後二十至二十五天採收，過期根球空心品質不佳。一球重量約十五公分左右為上品。市面銷路尚佳，去年在臺南一羣斤，約三元五角左右。(陳文郁)

花生結實不佳連作缺乏要素

【問】：我每年所種花生，開花後能結實者僅及花的半數，其餘一半，只有一條根在地下，沒有成莢，這是欠缺什麼？怎樣才能補救？(彰化縣芳苑鄉林進成)

【答】：花生結實不佳，乃因連作缺乏一微量要素，並培土不妥。可先試用，硫黃、錳、苦土三項，每分地施下各三羣斤。(余慶東)

雜種雞供應肉用兼用種生長較快

兼用種生長較快

【問】：想養雜種肉雞，請問那種雞與那種雞雜交，比較好養及生長比較快？普通蘆花雞與肉雞雜交，其種類怎樣？在飼養時期，在那個期間比較適當？是否冬季比較好？肉質那種比較好些？(屏東縣竹田鄉陳傳憲)

【答】：利用雜種供應肉用，以兼用種如蘆花、洛島紅、紐漢西等互相雜交者生長較快。應用普通蘆花雞與肉雞雜交，結果亦比較與其他本地雞之成績為佳。不管理何種家禽，在國曆十二月至翌年四月間孵化飼養

裕隆機器製造股份有限公司
YUE LOONG ENGINEERING CO., LTD.
(線四)四三四一三：話電 號六十街陽信市北臺：址地司公
六五·四五 店新：話電 林坪大鎮店新縣北臺：址地廠工



YLN-701 型四門小轎車

品 產 要 主

- (1) 五匹、六匹、十四、二十四、三十四、馬力柴油引擎及其配件
- (2) 六十四及七十四馬力汽油引擎及其配件
- (3) YL-1 型吉普式小汽車
- (4) YL-2 型加大客貨兩用車
- (5) YL-3 型一噸半載貨車
- (6) YL-4 型旅行車
- (7) YLN-101 型五噸汽油大卡車
- (8) YLN-502 RB 型柴油大客車
- (9) YLN-701 型四門省油小轎車
- (10) 各型汽車活塞、活塞銷、活塞環、汽車套筒、彈簧鋼板、等零件
- (11) 各型齒輪
- (12) 各型精密機件

◀ 顧 賜 迎 歡 ▶

肺癆病良藥問世

療肺散

主治
肺癆、吐血、止咳、痰黑、清肺、化痰、補虛、癆、肺的各種病症等。
內政部許可牌台衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

脚濕靈

主治
脚濕、氣病、脚氣、年久、不計、擦用後即止

癢癒病為脚趾濕氣病、專門治療藥
內政部許可台衛成字第三七三號

各地藥房均售
各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號
說明書函索即寄
臺北市重慶北路三段二四二號
景新製藥所出品

（四八）北市衛四廣檢字
第四〇五九號