

本地冬種瓜的栽培

王進生

冬瓜是很受歡迎的一種夏季蔬菜。隨着消費量的增加，栽培面積逐年擴大。下面介紹本地種冬瓜的栽培要點，以供農友們參考。

一、避免連作

冬瓜必須三—四年輪作（水田可縮短至二—三年）一次，連作時，容易發生病害。

栽培冬瓜，應儘量選擇平坦、表土較厚、排水良好的壤土或肥沃的砂質壤土。心土含有砂礫，排水良好的土地，最爲理想。在低窪地與粘質地栽培時，容易發生病害，結果情形也不好。

二、催芽後下種

冬瓜種子發芽所需時間較長，爲了縮短發芽日數，提高發芽率，無論直播或育苗栽培，都應先催芽後播種。

催芽方法如下：準備三寸高的陶器之容器或花盆。內裝河砂，將浸過一千倍「烏斯普龍」液一小時的種子，放入砂中，並且澆水使砂和種子潤濕。

然後，將容器埋入堆肥中隔二至三日澆水一次，避免過乾。

四、五天後，種子開始發芽。拿出發芽的種子，放在室內，使它冷卻後播下本圃或苗床。

三、保溫育苗

爲了初期管理的方便與提早栽植，最好先在苗床育苗後定植。十公畝（一分地）本圃約需二坪苗床。

將經過催芽的種子，一粒一粒播下苗床。苗距爲十至十二公分。

苗床最好用塑膠布覆蓋（可利用水稻秧田用的塑膠布覆蓋）保持適當的溫度攝氏二十五度。但在本葉三至四葉時，應該除去覆蓋，使苗株硬化。

四、五葉時定植

冬瓜的栽植適期爲三月上旬至三月下旬。（直播法較育苗法爲早）本葉五至六葉時定植。每十公畝地的栽植株數，爲二百至二百七十株。畦寬二·四至二·七公尺，株距一·五至一·八公尺（因土壤肥沃程度而異）。

定植直後，需要較多的水分，所以，在苗株活着後（定植後五至六天）晴天時應每日澆水。

五、分五次施肥

氮肥過多或過少，都會發生落果。每十公畝地的標準施肥量如下：氮素十二至十八公斤，磷酸五


怎樣

貯藏

冬瓜

種子

冬瓜種子的貯藏方法，與一般蔬菜種子不同。在園中選擇形狀標準的第一或第二顆冬瓜，以供留種之用。留種用冬瓜要等到充分成熟後採收。採收後連果貯藏，至播種期剖開拿出種子。如在採收後即時剖開刮出種子，應陰乾一、二天後，在屋簷下開淺穴，盛入河砂，再將陰乾的種子與河砂混合，埋入地下貯藏，以免乾燥。但是應注意不要使雨水流入穴中。



至七公斤，鉀八至十二公斤。爲使根群發達良好，每十公畝地應施用腐熟堆肥九百公斤，（即每一植株施下三·二至四·五公斤）

堆肥、過磷酸鈣及米糠

全部作爲基肥，在定植前二星期施下。第一次追肥在定植二星期後施用（離植株三十公分開環溝施下雞糞或腐熟人糞尿後覆土。）第二次追肥在莖長三十公分時施用，十公畝施肥量約人糞尿四百五十公斤。以後按生育情形施用腐熟人糞尿或硫酸銨稀釋液二至三次。

