


公分(即每六公分四方播種一粒)。播種後，用腐熟堆肥、土糞，或膨軟的土壤覆蓋，覆土後不宜鎮壓。播種後，苗床要敷稻草，並且灌水，使土壤保持適當的濕潤。但發芽前一天(自播種至發芽，春季需五天，夏季三天)，須除去敷草，並注意肥培管理。本葉二至三枚時，也就是水稻第一次除草直後時，移植到田畔。

### 三、田畔要加寬

水田整地前，先將田畔的雜草刈除，再用牛犁，將靠近田畔的田土犁靠田岸，然後犁耕水田。在水田刈耨前，水田略行灌水，等田土十分濕潤後，用手把土塗入田岸，使田岸增寬約十五公分，放待乾燥。

過去農友們爲了擴大水田面積，常將田畔兩邊削去很多，所以本省的大部份田畔，都很狹窄。田畔過窄，壞處很多，例如漏水、挑苗困難等。爲種



大豆田畔寬度圖

大豆，田畔塗土放寬後，田水不再流失，走路比較方便，同時潛伏田畔草內的害蟲與蟲卵等，都被塗入土中，自然死滅，減少農作物的損失。

稻田插秧後，等田岸乾燥時，先將田岸耙平，然後在新田岸靠近田畔的地方，用小型鐵釘，每隔二十公分開一植穴，施入基肥，與土糞混合，等第一次水稻除草後一、二天定植豆苗。

每公頃所需基肥：腐熟堆肥九千公斤、硫酸銨一百公斤，過磷酸鈣二百公斤，氯化鉀一百公斤。定植時，要特別注意絕不可損傷子葉，並應在

陰天下午定植，以免損傷。

### 四、注意客土與刈草

客土：爲防止豆苗倒伏，中耕除草後應挑土客土。

定植後十五天施行第一次中耕除草。先用小鋤拔除雜草並且中耕土壤，使土壤澎軟，然後把樹下或旱地的澎軟土糞，給豆株培土，防止豆株倒伏。再經過十五天後，施行第二次中耕除草及客土等，促成豆苗成育。

刈草：生育期間要刈草四次。第一次及第二次，與中耕客土時同時舉行。第三次在開花結莢時，第四次在豆莢中熟時，按期舉行。所刈的雜草，因撒有有機磷農藥，不要供作飼料。

其他的管理事項病蟲害防治，及收穫乾燥貯藏等，都與大豆一般栽培法一樣，可參看本刊第七卷第十四期。

### 肺癆病良藥問世

## 療肺散

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可牌臺衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

## 腳濕靈

主治

腳趾濕氣病 不計年久

擦用後即止

癢癥病為腳趾濕氣病、專門治療藥

內政部許可台衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥備金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品



(四八)北市衛四廣檢字  
第四〇五九號

### 「沙發美星」

注射液 33 3/4%

'SULPHAMEZATHINE' 33 3/4%

專治禽畜之腸炎  
肺炎，球蟲病及  
各種細菌性疾病

- 功效可靠迅速
- 使用簡便安全

### 「芬樂維斯」

'PHENOVIS'

防治禽畜之蛔蟲  
胃蟲盲腸蟲及各種  
寄生蟲性腸胃炎

• 治療預防均有效

### 「美尼」

'MINEL'

防治牛羊之蛔蟲  
及肝蛭蟲最有效



英國卜內門公司  
各種獸醫藥品

- 一經採用
- 保證滿意

說明書備索

現貨總經銷

## 永生西藥行

台北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六