

番茄 福壽二號、赤福三號、夏光、夏威夷一號、馬娜里、普立查、馬格羅、皮亞遜。

胡瓜 潮洋目瓜、落合筋成胡瓜、立秋胡瓜、長岡交配翠青胡瓜、內湖刺瓜。

甜椒 加州大甜椒、甘味大甜椒、好特福大甜椒。

高荳 黑籽細籽生、葛藍早生、普利美大湖、嫩荳高荳、矮性皇帝豆、好特福二四二美國原種。

蘿蔔 大白拔、三月可開始栽培。

西瓜 鳳山一號(富密)無子西瓜、密寶西瓜。

採種純正之品種能獲得較多的上級之生產品使你得到更大的利益。

有什麼不明之處函詢當能得到滿意的答覆。

興農種子行

本行 臺北縣三重鎮重新路一段四三三號
電話 四五三三二號
郵政劃撥四〇二八號

分行 員林鎮中正路二〇〇號

養業信箱

來克航產卵最多 肉用雞成熟較晚

【問】：①蛋用雞，在目前察省只有來克航雞產蛋最高嗎？是否還有其他種比來克航產蛋率高嗎？②肉用雞，九斤黃、狼山雞純良品種幼雞及種蛋，何處有出售(請示通訊處)？該兩種雞成熟性需要多少時間？由孵出至成熟每日的給與量多少(公斤或公分計算)？幼雞中雞成雞之飼料配和比及如何飼養的問題。③補註①之疑問，如有比來克航產蛋率高品種，何處出售幼雞或種蛋(請示通訊處及地址)？④露安鴨亞利司巴利鴨，何處有出售種蛋。孵化至成熟需要多少時間

，由小鴨至成熟每日飼料給與量多少(公斤或公分計算)？(彰化二水蔡明)

【答】：一、蛋用雞在本省現在只有來克航雞產卵最多的了。二、肉用雞如九斤黃、狼山雞本省尚無此品種引進。此種肉用種雞成熟期較晚，不均開始產蛋的年齡要九個月左右。從孵出到開始產蛋所需混合飼料約十八公斤，開始產蛋後每日飼料約需一百三十公分。飼養管理與蛋用雞大同小異，不過在運動上略予限制，在肥期可全部應用碳水化合物飼料如玉米、糙米等。三、露安及亞里司巴利鴨，前者為法國種後者為英國種，兩者均肉用品種，本省未引進該兩品種繁殖

來信請儘量利用郵政明信片。信中直接提出問題，請不要講客氣話。記得寫你自己的姓名住址、信的正反面，「養問」二字。

勝過從來之石灰硫黃合劑，可以安心使用

日農：水和硫黃劑

サルボン90

成分90%：500g包裝
適用作物與使用倍數

小麥：赤銹病 赤腐病 500倍
蔬菜類(含瓜類)：ウドンコ病ダニ類 500—1,000倍
果樹(含柑桔、茶樹)：ハダニ類 400—500倍

- 特長
- ①不損噴霧器且比自製石灰硫黃合劑使用成本便宜
 - ②具有強力的殺菌力兼殺紅蜘蛛(ダニ)サビダニハダニ類等
 - ③不污穢果實
 - ④藥劑使用調製極簡單
 - ⑤極微粉高濃度高品位90%以上

備註：本劑在於日本農民最普遍愛用

吉本農畜用品社 臺中民權路88號 TEL3691

飼蟲用倍安片驅除 羊糞可作果樹肥料

【問】：一、養了一些一月以上的小鴨，用蝸牛玉米等飼料餵飼，為什麼從糞便中發現如白棉線一樣的蟲，約五釐寸長，不知是否蛔蟲？應用何藥醫治？服法如何？(花蓮、玉里、月雨)

【答】：一、你的鴨隻糞便中發現白棉線之長蟲，如果是扁而扁者則為蛔蟲，若無節而為圓條狀者則為蛔蟲。對蛔蟲現下尚無特效藥可供驅除，對蛔蟲則應用(口服)倍安(P、N)片效果甚佳。P、N片亦有部份驅除蛔蟲之效果，至於用量請參照該說明書給與為要。二、羊糞含氮〇·六%，磷卅〇

飼養，故無法購到。四、肉用種開始產蛋年齡平均為七—八個月，從小鴨至開始產蛋，需要混合飼料量約為十五公斤，產蛋後每日食糧約為一百三十三至一百四十公分。(李登元)


防治稻縱捲葉蟲 藥劑要噴稻葉上

【問】：茲附寄水稻書蟲標本請將防治法見告。(臺東縣太田鄉彭德慶)

【答】：所附標本為稻縱捲葉蟲，因為蟲子在捲葉內，藥劑無法噴到身體上，或吃到肚內，或接觸身上。所以今後請在第二期作時注意，一看到開始捲葉的水稻，就開始撒布有效成份1% BHC粉或10% DDT粉劑，每次每公頃二十至三十公斤已足。要用噴粉器噴，並噴在稻葉上，不要噴在稻莖或稻根上。(陶家駒)

瓜類等金龜子幼蟲 可用阿特靈等防治

【問】：①本人畑土底很多「鷄母蟲」，因此種植瓜類或是落花生，該根部被剪斷，



忠實的耕牛·農家的汽車
嘉禾牌 K-3 型耕耘機

優點：

- ①裝有齒輪變速機
- ②前進後退自由
- ③機身構造堅固
- ④汽油柴油引擎均可使用
- ⑤操作簡便
- ⑥可向土地銀行、合作金庫及農會貸款

△函索即寄
詳細說明書▽

振豐鐵工廠榮譽出品

廠址：中壢鎮建國路三九號(電話中壢三一七轉呼)
連絡處：臺北市重慶北路二段四號宏業商行農機部
臺中市建國路一一四號 國華電器廠