

番茄 福壽二號、赤福三號、夏光、夏威夷一號、馬娜里、普立查、馬格羅、皮亞遜。

胡瓜 潮洋目瓜、落合筋成胡瓜、立秋胡瓜、長岡交配翠青胡瓜、內湖刺瓜。

甜椒 加州大甜椒、甘味大甜椒、好特福大甜椒。

高荳 黑籽細籽生、葛藍早生、普利美大湖、嫩荳高荳、矮性皇帝豆、好特福二四二美國原種。

蘿蔔 大白棧、三月可開始栽培。

西瓜 鳳山一號(富密)無子西瓜、密寶西瓜。

採種純正之品種能獲得較多的上級之生產品使你得到更大的利益。

有什麼不明之處函詢當能得到滿意的答覆。

興農種子行

本行 臺北縣三重鎮重新路一段四三三號
電話 四五三三二號
郵政劃撥四〇二八號

分行 員林鎮中正路二〇〇號

養業信箱

來克航產卵最多 肉用雞成熟較晚

【問】：①蛋用雞，在目前察省只有來克航雞產蛋最高嗎？②肉用雞，九斤黃、狼山雞純良品種幼雞及種蛋，何處有出售(請示通訊處)？該兩種雞成熟性需要多少時間？由孵出至成熟每日的給與量多少(公斤或公分計算)？幼雞中雞成雞之飼料配和比及如何飼養的問題。③補註①之疑問，如有比來克航產蛋率高品種，何處出售幼雞或種蛋(請示通訊處及地址)？④露安鴨亞利司巴利鴨，何處有出售種蛋。孵化至成熟需要多少時間

，由小鴨至成熟每日飼料給與量多少(公斤或公分計算)？(彰化二水蔡明)

【答】：一、蛋用雞在本省現在只有來克航雞產卵最多的了。二、肉用雞如九斤黃、狼山雞本省尚無此品種引進。此種肉用種雞成熟期較晚，平均開始產蛋的年齡要九個月左右。從孵出到開始產蛋所需混合飼料約十八公斤，開始產蛋後每日飼料約需一百三十公分。飼養管理與蛋用雞大同小異，不過在運動上略予限制，在肥期可全部應用碳水化合物飼料如玉米、糙米等。三、露安及亞里司巴利鴨，前者為法國種後者為英國種，兩者均肉用品種，本省未引進該兩品種繁殖

來信請儘量利用郵政明信片。信中直接提出問題，請不要講客氣話。記得寫你自己的姓名住址、信的正反面，「養問」二字。

勝過從來之石灰硫黃合劑，可以安心使用
日農：水和硫黃劑

サルソン90

成分90%：500g包裝
適用作物與使用倍數

小麥：赤銹病 赤霉病 500倍
蔬菜類(含瓜類)：ウドンコ病ダニ類 500—1,000倍
果樹(含柑桔、茶樹)：ハダニ類 400—500倍

- 特長
- ①不損噴霧器且比自製石灰硫黃合劑使用成本便宜
 - ②具有強力的殺菌力兼殺紅蜘蛛(ダニ)サビダニハダニ類等
 - ③不污穢果實
 - ④藥劑使用調製極簡單
 - ⑤極微粉高濃度高品位90%以上

備註：本劑在於日本農民最普遍愛用

吉本農畜用品社 臺中民權路88號 TEL3691

飼蟲用倍安片驅除 羊糞可作果樹肥料

【問】：一、養了一些一月以上的小鴨，用蝸牛玉米等飼料餵飼，為什麼從糞便中發現如白棉線一樣的蟲，約五釐寸長，不知是否蛔蟲？應用何藥醫治？服法如何？(花蓮、玉里、月雨)

【答】：一、你的鴨隻糞便中發現白棉線之長蟲，如果是扁而扁者則為蛔蟲，若無節而為圓條狀者則為蛔蟲。對蛔蟲現下尚無特效藥可供驅除，對蛔蟲則應用(口服)倍安(P、N)片效果甚佳。P、N片亦有部份驅除蛔蟲之效果，至於用量請參照該說明給與為要。二、羊糞含氮〇·六%，磷卅〇

飼養，故無法購到。四、肉用種開始產蛋年齡平均為七—八個月，從小鴨至開始產蛋，需要混合飼料量約為十五公斤，產蛋後每日食糧約為一百三十至一百四十公分。(李登元)


防治稻縱捲葉蟲 藥劑要噴稻葉上

【問】：茲附寄水稻書蟲標本請將防治法見告。(臺東縣太田鄉彭德慶)

【答】：所附標本為稻縱捲葉蟲，因為蟲子在捲葉內，藥劑無法噴到身體上，或吃到肚內，或接觸身上。所以今後請在第二期作時注意，一看到開始捲葉的水稻，就開始撒布有效成份1% BHC粉或10% DDT粉劑，每次每公頃二十至三十公斤已足。要用噴粉器噴，並噴在稻葉上，不要噴在稻莖或稻根上。(陶家駒)

瓜類等金龜子幼蟲 可用阿特靈等防治

【問】：①本人畑土底很多「鷄母蟲」，因此種植瓜類或是落花生，該根部被剪斷，



忠實的耕牛·農家的汽車
嘉禾牌 K-3 型耕耘機

優點：

- ①裝有齒輪變速機
- ②前進後退自由
- ③機身構造堅固
- ④汽油柴油引擎均可使用
- ⑤操作簡便
- ⑥可向土地銀行、合作金庫及農會貸款

△函索即寄
詳細說明書▽

振豐鐵工廠榮譽出品

廠址：中壢鎮建國路三九號(電話中壢三一七轉呼)
連絡處：臺北市重慶北路二段四號宏業商行農機部
臺中市建國路一一四號 國華電器廠

損害頗重，有什麼防治法？

②施肥則是堆肥內亦是有發生「鷄母蟲」，並請示防治法。(元蓮藤、玉里鎮曾天保)

【答】：你所附標本為金龜子幼蟲，可用有效成份1% BHC粉每公頃施一百三十五公斤，混入土中或同堆肥混入土中，可防止其為害。一定要在種植瓜類或花生前施入土中。最近應用阿特靈40%可濕性粉和土或水混入土中，效力更好。(陶家駒)

平面孵化器孵鴨蛋

注意適宜溫度濕度

【問】：本人現使用平面式孵卵器，孵一陸地鴨蛋，孵成率甚低，(有很多將出殼而死亡)未知是何故？聞有達入十%之孵成率者，請賜示復。(方卓毅)

【答】：一、平面孵化器孵鴨蛋之溫度，以其蛋上一寸處之溫度華氏一百零一度為宜。二、濕度為相關濕度百分之七十五—八十。三、排卵之形式為平排。翻卵第一星期每日每隔四小時翻卵一次(每日六次)，第二、三星期每日每隔六小時翻一次(每日四次)(每日三次)翻卵一次即可，第二十四日即不翻卵待孵出。四、氣孔第一星期開其四分之一，第二星期開二分之一，第三星期開四分之三，第四星期可全開。五、通常停電室溫應提高(加火盆)。室溫提高在華氏八十度左右，停電四小時，其影響尚小，若停電半天以上，則孵化成續大受影響。(李登元)

柑桔發生煤煙病

應驅殺寄生蟲害

【問】：(一)柑桔發生煤煙病，噴射何種農藥最有效，噴射方法如何？

(二)隨園附上文巨樹枝乙節，枝上所染之病徵，係何種病害，有何特效藥可施用？(臺南縣南化鄉西埔村李祖英)

【答】：(一)柑桔發生煤煙病係因介殼蟲或蚜蟲之寄生而引起，故驅殺該等蟲害即可有效防治煤煙病。

(二)文巨樹枝乃因介殼蟲之為害，可

用馬拉松、松脂合劑，或夏油乳劑噴佈防治。(莊德榮)

鱈魚線蟲類寄生蟲

可用孔雀綠液防治

【問】：查本鎮四健會會員莊仁敏所養鱈魚一個月前發生魚蝕，日有死亡者，恐怕血本盡失。請將該病有效藥品見告。(南投縣集集鎮農會簡瑞唐)

【答】：一、由台端所寄下之標本檢查，該等鱈魚並非鱈魚蝕(魚蝕是甲殼類之寄生)，而是線蟲類之寄生。

二、愛克粉、魚寶等農藥對此種寄生蟲皆無效。

三、在臺灣此等寄生蟲大益危害池魚尚是初次發現。按照外國對此種寄生蟲之防治將魚放於1:18000濃度之孔雀綠(Malachite Green)液中三〇—四十五分鐘(放淺水魚池，按上記濃度施行三〇—四十五分鐘，再多灌水亦可)此寄生蟲自會毒死。(唐允安)

灌溉蕉園可以早收

種植蕉苗約一公尺

【問】：我欲於十二月至二月收穫香蕉，應該何時下種，蕉苗株應長若干為度。如於元月下旬種植，預想在明年十二月份開始收穫，應種株長若干尺寸之蕉苗為宜？(臺東羅健鳴)

【答】：香蕉自種植到採收月數，依地區、地勢蕉苗大小以及氣候，栽培管理等均有很大差異。南部平地可以灌溉蕉園，自種植到採收，需時十至十四個月。中部山地栽培，則需要十六至十九個月，平地需十二至十六個月。一般言之，平地收穫較快，南部比中部可以早收，尤其是可以灌溉蕉園比不能灌溉者，可以提早採收數個月。先生擬於十二至二月收穫香蕉，若蕉園是山地，應該於八至九月種植，若可灌溉的平地，可於十一至十二月種植。加以應行肥培管理，可望於九至十月開花，而於十二月至二月採收。

種植蕉苗高度約一公尺左右。如於元月下旬

養雞朋友的佳訊!! 免費

贈送!!!

「養雞常識」通信乙份。

附檔寫明白住址姓名之回信信封，即送最新編印「養雞常識」通信一份。限送一萬份送完為止(送完以後之索取恕不答覆)

本廠為酬謝 各位養雞朋友多年來之愛顧，經編印有關養雞之最新常識「養雞常識」通信二萬份免費奉送，藉資養雞技術之研究。

內容：●電子養雞及原子孵化。●飼養管理指導的蛋白質必要份量。●養雞與溫度調節。●雞病講座 ●養雞經驗談

國際家畜藥物廠

臺北縣板橋鎮館前路五十二號之五



裕隆機器製造股份有限公司

YUE LOONG ENGINEERING CO., LTD.

(線四)四三四一三：話電 號六十街陽信市北臺：址地司公

六五·四 五店新：話電 林坪大鎮店新縣北臺：址地廠工



YLN-701 型四門小轎車

品 產 要 主

(1) 五四、六四、十四、二十四、三十四、馬力柴油引擎及其配件

(2) 六十四及七十四馬力汽油引擎及其配件

(3) YL-1 型吉普式小汽車

YL-2 型加大客貨兩用車

YL-3 型一噸半載貨車

YL-4 型旅行車

YLN-101 型五噸汽油大卡車

YLN-502 RB 型柴油大客車

YLN-701 型四門省油小轎車

(4) 各型汽車活塞、活塞銷、活塞環、汽車套筒、彈簧鋼板、等零件

(5) 各型齒輪

(6) 各型精密機件

◀ 顧 賜 迎 歡 ▶

種植者，採用〇·八一公尺之蕉苗，如管理優良者，可於當年十二月開始採收，如無法灌溉者，則需時較久。(朱慶國)

龍眼隔年結果

注意補救辦法

龍眼有隔年結果的習性，如何避免這樣的習性？(彰化二水鄉許坤清)

龍眼隔年結果的習性，是因上年結果太多，以致樹勢衰弱，不能在次年再結大果實，甚至完全不結果。龍眼的花序從上年所生枝梢的頂端抽出，結果以後，這個枝梢再無力抽出新枝，所以這個枝梢明年就不會結果了。

隔年結果的補救法：①在開花多的年份，在花期中摘除一部分花穗，使它們早發新枝，以供明年結果。②注意肥培管理，尤其在結果多的年份，必須施以充足肥料。(蔡致毅)

各種優良農藥現貨廉供

殺菌劑

裕米農乳劑、銨劑、伏德能乳劑、銨劑、新美裕銨劑、飛突邁新、水銀波爾多

殺蟲劑

馬拉松、安特靈、大利農、新殺斃卵、砒酸鉛、軟蛭倒爾、ネマヒユム30、把拉松乳劑等

保柑素

特製利農展着劑、MH30等其他農藥均備

各種優良春季蔬菜種子均備

本公司編印一九六〇年農友手冊附成本費二元(郵票)農藥詳細說明書函索即寄

專營農業生產資材貿易商

臺灣農產企業公司 臺灣農業資材公司

臺北市迪化街一段八十六號

劃儲臺灣一二七九九 電話四四二五三·四二三六五

生薑可乾燥貯藏 乾薑糖薑可外銷

山上的薑，去年迄今，全省所有農友種植於價格慘跌，目前只好任它腐爛。聽說薑可以「一藥」，做糖薑片、做薑粉、提煉「薑油」等。但外銷方面，又缺少此方面的消息，提煉「薑油」作何種用？(宜蘭三星鄉李受成)

本省生產之生薑，大部分是以乾薑和糖薑外銷，也有製造甜酸薑罐頭或鹽薑，運往香港等地。對於薑油之製造，省內還沒有有人製造，生薑含油量不多，但確可作醫藥用途。一般生薑產出期中，價格低廉時，可乾燥貯藏好，待缺乏期中出售，也可以製薑粉、蜜餞、醃薑或醋漬品等。「薑粉」之製造，請參看豐年五卷三期，「蜜餞嫩薑」之做法，請看豐年四卷二十四期，曾有發表。(朱仙和)

特殊新品種 順隆春季早生問世!!

一、7045 天梅花：三月中旬播種，四月下旬收穫，每畝產量二萬五千斤。二、7046 天梅花：三月中旬播種，四月下旬收穫，每畝產量二萬五千斤。三、馬拉松：新種圓形，清紅，春夏種植，耐熱抗病。四、刺波豆：白性，青莢，清紅，春夏種植，耐熱抗病。五、粗米絲瓜：青莢，清紅，春夏種植，耐熱抗病。六、大生三十三：防治西瓜各種病害，特製藥劑。

順隆種子行 其他適時種子農藥 各種優良春季蔬菜種子均備

農藥現貨供應 (美國原裝)

大生七十八 (DITHANE Z-78) 可濕性粉劑可防止大豆及小麥病，柑桔象皮病及黑星病，菸草白星病及赤星病，甘藍炭疽病及菌病及一般蔬菜疫病，紫斑病，炭疽病及銹病。

大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防止西瓜，胡瓜，番茄及馬鈴薯病害。並能促進生長增加產量。對番茄可增加產量至六成半。亦能防治蚜蟲。

可利生 (KARATHANE WD) 可濕性粉劑不特可防止白粉病並可治好已發生的白粉病。亦能防治蚜蟲。

開路生 (KELTHANE W) 可濕性粉劑專治各種蚜蟲。



大生七十八可濕性粉劑三磅紙袋美國原裝

臺灣總代理 青象貿易有限公司 臺北市中正路1756號三樓 電話：27467 郵政劃儲臺灣第2156號 函索農藥說明書附郵票四角即寄

藥效特收增水稻 水日特許 寒冷時期秧苗生長救星 適用期：自插秧15天前起至插秧當日 一促進發根，健康幼苗 一增加分枝，提高收量 〇フルートン (果實多旺)；防止落花落果，增加收量 〇ルートン (根多旺)；種子，插木，接木用 〇各種殺蟲殺菌劑批發 (中農化工廠出品……) 說明書函索即寄(請付郵票4角) 石原產藥株式會社 總代理店 大豐農藥股份有限公司 臺北市漢口街1段23號