

損害頗重，有什麼防治法？

②施肥則是堆肥內亦是有發生「鷄母蟲」，並請示防治法。(元蓮藤、玉里鎮曾天保)

【答】：你所附標本為金龜子幼蟲，可用有效成份1% BHC粉每公頃施一百三十五公斤，混入土中或同堆肥混入土中，可防止其為害。一定要在種植瓜類或花生前施入土中。最近應用阿特靈40%可濕性粉和土或水混入土中，效力更好。(陶家駒)

平面孵化器孵鴨蛋

注意適宜溫度濕度

【問】：本人現使用平面式孵卵器，孵一陸地鴨蛋，孵成率甚低，(有很多將出殼而死亡)未知是何故？聞有達入十%之孵成率者，請賜示復。(方卓毅)

【答】：一、平面孵化器孵鴨蛋之溫度，以其蛋上一寸處之溫度華氏一百零一度為宜。二、濕度為相關濕度百分之七十五—八十。三、排卵之形式為平排。翻卵第一星期每日每隔四小時翻卵一次(每日六次)，第二、三星期每日每隔六小時翻一次(每日四次)(每日三次)翻卵一次即可，第二十四日即不翻卵待孵出。四、氣孔第一星期開其四分之一，第二星期開二分之一，第三星期開四分之三，第四星期可全開。五、通常停電室溫應提高(加火盆)。室溫提高在華氏八十度左右，停電四小時，其影響尚小，若停電半天以上，則孵化成續大受影響。(李登元)

柑桔發生煤煙病

應驅殺寄生蟲害

【問】：(一)柑桔發生煤煙病，噴射何種農藥最有效，噴射方法如何？

(二)隨園附上文巨樹枝乙節，枝上所染之病徵，係何種病害，有何特效藥可施用？(臺南縣南化鄉西埔村李祖英)

【答】：(一)柑桔發生煤煙病係因介殼蟲或蚜蟲之寄生而引起，故驅殺該等蟲害即可有效防治煤煙病。

(二)文巨樹枝乃因介殼蟲之為害，可

用馬拉松、松脂合劑，或夏油乳劑噴佈防治。(莊德榮)

鱈魚線蟲類寄生蟲

可用孔雀綠液防治

【問】：查本鎮四健會會員莊仁敏所養鱈魚一個月前發生魚蝨，日有死亡者，恐怕血本盡失。請將該病有效藥品見告。(南投縣集集鎮農會簡瑞唐)

【答】：一、由台端所寄下之標本檢查，該等鱈魚並非鱈魚蝨(魚蝨是甲殼類之寄生)，而是線蟲類之寄生。

二、愛克粉、魚寶等農藥對此種寄生蟲皆無效。

三、在臺灣此等寄生蟲大益危害池魚尚是初次發現。按照外國對此種寄生蟲之防治將魚放於1:18000濃度之孔雀綠(Malachite Green)液中三〇—四十五分鐘(放淺水魚池，按上記濃度施行三〇—四十五分鐘，再多灌水亦可)此寄生蟲自會毒死。(唐允安)

灌溉蕉園可以早收

種植蕉苗約一公尺

【問】：我欲於十二月至二月收穫香蕉，應該何時下種，蕉苗株應長若干為度。如於元月下旬種植，預想在明年十二月份開始收穫，應種株長若干尺寸之蕉苗為宜？(臺東羅健鳴)

【答】：香蕉自種植到採收月數，依地區、地勢蕉苗大小以及氣候，栽培管理等均有很大差異。南部平地可以灌溉蕉園，自種植到採收，需時十至十四個月。中部山地栽培，則需要十六至十九個月，平地需十二至十六個月。一般言之，平地收穫較快，南部比中部可以早收，尤其是可以灌溉蕉園比不能灌溉者，可以提早採收數個月。先生擬於十二至二月收穫香蕉，若蕉園是山地，應該於八至九月種植，若是可灌溉的平地，可於十一至十二月種植。加以應行肥培管理，可望於九至十月開花，而於十二月至二月採收。

種植蕉苗高度約一公尺左右。如於元月下旬

養雞朋友的佳訊!! 免費

贈送!!!

「養雞常識」通信乙份。

附檔寫明白住址姓名之回信信封，即送最新編印「養雞常識」通信一份。限送一萬份送完為止(送完以後之索取恕不答覆)

本廠為酬謝 各位養雞朋友多年來之愛顧，經編印有關養雞之最新常識「養雞常識」通信二萬份免費奉送，藉資養雞技術之研究。

內容：●電子養雞及原子孵化。●飼養管理指導的蛋白質必要份量。●養雞與溫度調節。●雞病講座 ●養雞經驗談

國際家畜藥物廠

臺北縣板橋鎮館前路五十二號之五



裕隆機器製造股份有限公司

YUE LOONG ENGINEERING CO., LTD.

(線四)四三四一三：話電 號六十街陽信市北臺：址地司公

六五·四 五店新：話電 林坪大鎮店新縣北臺：址地廠工



YLN-701 型四門小轎車

品 產 要 主

(1) 五四、六四、十四、二十四、三十四、馬力柴油引擎及其配件

(2) 六十四及七十四馬力汽油引擎及其配件

(3) YL-1 型吉普式小汽車

YL-2 型加大客貨兩用車

YL-3 型一噸半載貨車

YL-4 型旅行車

YLN-101 型五噸汽油大卡車

YLN-502 RB 型柴油大客車

YLN-701 型四門省油小轎車

(4) 各型汽車活塞、活塞銷、活塞環、汽車套筒、彈簧鋼板、等零件

(5) 各型齒輪

(6) 各型精密機件

◀ 顧 賜 迎 歡 ▶