

地靈黴素
 溶性粉劑(禽畜用)
TERRAMYCIN
 ANIMAL FORMULA SOLUBLE POWDER



本品為可溶性粉劑，備作混和飼料或食水，供家畜飼飲，無論牛羊豬狗貓均可適用，功能治療及防止多種常遇之疾患。

用法及用量：
 (一平茶匙等於五公分)

1 豬類

瀉痢 (俗稱疳奶屎)

預防用量：

每加侖之食水，牛奶或乳類代用品，或每五磅飼料用本粉劑一平茶匙，繼續施用四五日。

治療用量：照預防用量加倍。

呼吸器官病 肺炎、支氣管炎、肋膜炎、船舶熱、及因肺炎引致之細菌併發症。

治療用量：每加侖之食水，牛奶或乳類代用品用本粉劑三至四平茶匙，繼續施用四五日。

萎縮性鼻炎 當萎縮性鼻炎蔓延於畜群時，採用本粉劑能有助保持發育增進率，用量可按每加侖之食水或每五磅飼料用本粉劑二平茶匙，繼續施用至病癒為止。

螺旋體炎症 畜類患螺旋體炎症用本粉劑可以減少流產。用量可按每加侖之食水或每五磅飼料用本粉劑五平茶匙。

2 鷄禽

藍冠病 (亦稱汚泥熱或非特异性腸炎)

預防用量：每兩加侖之食水或每十磅飼料用粉劑一平茶匙。

治療用量：照預防用量加倍。

火雞傳染性腸黏膜炎 每加侖食水或每五磅飼料用一平茶匙。

慢性呼吸器官病 (即氣泡)

鷄禽患此症時用本粉劑能有助於減低死亡率，用量可按每加侖食水或每十磅飼料用本粉劑一平茶匙。

傳染性滑膜炎

治療用量：每加侖食水或每十磅飼料用本粉劑二平茶匙。

鷄禽在神經緊張狀態時

鷄禽遇選徙、防疫接種、氣溫突變等情況下、用本粉劑能防免地靈黴素能有效治療細菌所引致之疾病。用量可按每兩加侖之食水，或每十磅飼料用一平茶匙。

包裝 西安士瓶裝 半磅瓶裝 十磅罐裝 三種 每磅內含地靈黴素鹽酸二十五公分。

美國輝瑞大藥廠出品

臺灣總代理：永裕行德記股份有限公司

臺北市漢口街一段四五號 電話：27429