

！理處心小要，草稗的除拔

——來 萬 張——

水稻在抽穗前期到收穫前這一段成熟期間，正是拔除稗草最重要的時期。因為在這時期，稗草已經抽穗，稗穗在稻田高出稻穗一層，最容易看出。同時，稗穗種子數目很多，假如不趁早拔除，很容易脫落田間，遺害下期作稻田。

最近，我們在稻田裡時常可以看到許多稗穗，穗上種子早已脫落，只剩下一支空空的穗枝，這是一件很危險的事情。稗草一定要在穗上的種子還沒成熟或脫落以前，澈底拔除才好。

但是我們還可以看到一些農友，雖然及時拔除了稗草，可是却忽略了拔除後的稗草處理工作，失去了拔稗的效果。

例如把拔取的稗草，隨隨便便丟在田角或田埂上，結果，稗穗被太陽曬乾，種子脫落，不但會落進自己稻田，而且會掉到隔壁他人的稻田裡，反而幫助稗子的傳播繁殖。

又如把稗草亂丟在灌溉排水溝裡，結果稗草種子隨着溝水流進稻田裡。第二期作稻田的稗草，大多是由灌溉水帶進來的。


又有些農友，把拔取的稗草，一堆堆的堆積在稻田鄰近的農道或公路上，這樣堆積，被風吹散各地，也會繼續生長繁殖。

一部份農友，為節省飼料，往往利用稗草喂牛。稗草種子，是不容易消化殺死的。結果，它跟着牛糞，再回到田裡繼續繁殖。用稗草餵鴨子，也會有同樣的結果。



又有許多農友，利用拔取的稗草（連稗穗一起），製造堆肥。因為稗穗上的種子，很不容易腐爛，為稗穗上的種子，所以，稗草種子又隨着堆肥再回到稻田。

最妥當的稗草處理方法如下：水稻抽穗後，可單單割取或拔除稗穗。此時應準備大、小兩個竹籬，大的放在田角，小的拿在手裡，將拔下來的稗穗，放進小竹籬裡，等小竹籬裝滿後，再放進大竹籬裡。

工作完畢後，把大竹籬的稗穗帶回家裡，用火燒却



• 料肥可做草的下剩，却燒火用部穗草稗
• 料材的肥堆造製為做以可部葉莖



家庭藥包真害人
便藥亂食是噓通

，散痛止面內包藥③
，（服試）看食來開打緊趕
，歡頭心能萬影有
• 活快人痛止時暫

，子個一生單忠阿②
，痛肚腹然忽（子兒的他）子因
，驚免無（說他）講伊忠阿
• 行時有包藥家庭

，利便真包藥庭家①
，邊門到昌人銷推
，視巡來次一月每
• 錢收後品藥用先

老癸
金卯
圖文

，剩下的草灰，可做肥料使用。
 假如連根拔除稗草時，應從穗部用刀切斷，稗穗用火燒却，草灰做肥料施用；莖葉部份，可以做為堆肥的材料。這樣處理稗草，一定可以慢慢地消滅稗草。

理想的雞舍與優良的雞種

農復會畜牧組

問：據最近的「讀者文摘」雜誌報導，美國的養雞場機械化的結果，一個工人可以管理七千隻產卵雞。請問在本省目前的環境下，雞場應如何機械化，是否合算？

答：根據本省現有較大養雞場的經驗，用籠飼的方式，一個人可以管理到五百至一千隻產卵雞。臺灣人工比較便宜，以機械代替人工，並不一定合算，但是應注意建築合理的雞籠，以節省人工。

問：本省賣小雞的很多，可是不知道那一家最可靠。據說貴組有美國種雞出售，不

知手續如何，假如貴組沒有種雞出售，請代為介紹可靠的種雞場，以便洽購。

答：本會最近引入的種雞蛋，已交臺南縣新化鎮新化畜產試驗所繁殖，以後計劃經過各區農林改良場等機構推廣。除公雞外，目前還沒到達推廣的階段。（參看三十二頁「本刊啓事」）

你假如需要以前引入的種雞，請向臺中市南屯區農林改良場洽購。


註：上面是農復會畜牧組給臺中縣沙鹿鎮的蔡欽敏，與臺中市的王樹聲兩位先生，有關養雞問題的解答。



畜化新交巴，蛋鴿伊的入引國美由近最會復農
 批一頭給買人術技所該為圖上。鴿繁化那所驗該產
 （攝 統銘翁）。形情的雄雌別鑑鴿小的出孵



，人害質包藥庭家⑥
 ，（以可不）通應是食亂藥便
 ，（效無）工彩無了食痛小
 。望無命了食病大



，奇稀無腸盲性急⑤
 ，時了誤藥便（怕）驚只
 ，院入去緊趕（虧幸）哉佳
 。醫苦艱較比然雖



，痛（再）悶又久不是但④
 ，（停不）定扶痛吐那嘔那
 ，（道知）影知即忠阿時這
 。命生求院入子送