

說來，南部地區種子成熟期在六—七月，北部約在十一—十一月間。結種子的樹齡，在十年以後才開始，第十五—二十年間，是結實的最旺盛時期。以後就漸漸減少，到三十年以後，差不多全部停止結實了。

母樹砍伐後，萌芽力很強。在砍伐的樹頭，能再萌芽三條至六條，叢立樹頭。可以選留最優良的一條，留作更新用，其餘的全部砍去。

本省南部各熱帶林區，如旗山、竹頭角、潮州、新化、東勢等地，早在民國十四年左右，即已引

△農業小知識▽

夏油對柑桔接穗的影響

噴過夏油乳劑不久，就採取接穗，而像本省一般苗農一樣實施接穗時，可能會影響成活率。

本省苗農接穗時，多預先將接穗削在盛水的碗裏，這樣接穗上的油分就溶到水裏，接穗切面就被染上油分，影響癒合組織的生成。但是假如接穗隨削隨接，而刀面也隨時保持清潔（常用乾淨布片拭抹），就不致減低接活率。噴過夏油乳劑的果樹，要經過二、三個月，附着的油分才會被雨水或露水洗淨，不再影響成活。（致讓）

栽培葛藤須知

臺南新化畜產試驗所贈送本刊讀者的熱帶葛藤種子，將於近日內寄出，拿到這項種子的農友，除了參看本刊九卷廿三期外，並請注意下列幾點：①播種適期自三月至九月。②播種前先浸種十二至十六小時。③單作行距六十至一百公分（坡度大時行距縮小），混作行距一百至一百二十公分。④播種深度一至三分，但是在砂壤栽培應稍深。⑤開播

入麻六甲合歡，現在已有三十幾年了。我們可以把這些原存大樹保留，作為母樹，加以保護撫育，來採種繁殖造林。如種子不夠，可請有關機構，向原產地購買。一方面再培養新的母樹林，以便源源不斷地採種。留作母樹用的，行株距應加寬，並且不可打枝，使枝葉儘量擴展。

麻六甲合歡，可和相思樹或其他樹種混合造林，以充分利用地力。如用它來做咖啡園的遮蔭樹，也是很好的。（本文取材洪真斌、劉新樓二位先生的調查研究報告）

種溝後，每公頃施磷肥三百公斤，鉀肥一百公斤，覆一層薄土後，點條播種。（葉苗田）

紫雲英的肥份

根據肥料公司的化驗分析，一萬公斤的紫雲英新鮮莖葉，約含氮素三十公斤。

桃園縣的紅壤，每公頃用氮素八十至九十公斤已足，這八九十公斤的氮素，不可全賴紫雲英供給。假如每公頃用紫雲英兩萬公斤，應再加用硫酸銨一百至一百五十公斤。如果紫雲英生長太好，產量很高，應該把它刈取一部，用到其他田地或作物上。桃園沿海地帶的砂質壤土，紫雲英及化肥用量，應較紅壤減少。稻田種過紫雲英後，須補充磷肥。（清）

麻六甲合歡與鳳凰木

麻六甲合歡的葉，是二回偶數羽狀複葉，外形很像鳳凰木，但是細看則差異很大。

麻六甲合歡總柄上的小複葉對生的基部，有一凸狀物的腺體，而鳳凰木沒有。

麻六甲合歡樹形高大，幹部分枝較少，幹部豐滿端直而材積多，鳳凰木則相反。（南）

如何減少子猪發生

白痢病？

各位農友！出生不久（約三星期內）的子猪很容易患白痢（放乳屎）、原因是很多，尤其是母猪子猪飼料中欠乏礦物質所引起母猪子猪患貧血子猪下白痢也是很多。

猪安寧命 是礦物質綜合製劑，對於母猪子猪貧血及預防子猪白痢及子猪肺炎等有卓越功效。

母猪配種後喂食

猪安寧命

也有左記效能

- ◎產前產後便秘、補胎安胎
- ◎猪胎平均健全、發育按期生產
- ◎產後增進食慾（不會餓糟）
- ◎奶之分泌旺盛
- ◎子猪元氣肥胖活潑毛草光澤

說明書備索

鴻春家畜藥物廠

臺北縣板橋鎮長安18號之6
郵政劃撥儲金第三八一號