

三百至四百倍水溶液，於病害尚未發生前每隔十日噴射一次，連續四次，至收穫前一星期停止。

鳳梨粉介殼蟲

① 於鳳梨種植前，用四六·六%「富粒多」或四七%「巴拉松」二千倍水溶液，浸苗三分鐘。定植後一個月左右，再以同種類濃度之藥劑，作第一次澆藥，每株自根部灌入一百立方公分(100)，以後每隔三個月澆藥一次，連續三十四次，同時用二二%「阿特靈」乳劑五十倍水溶液，噴射鳳梨園土地表面，以防螞蟻。如係新墾園地，附近又無老園，此項防蟻工作可免。

② 澆苗時期，以採苗後一—二星期為最佳。

③ 外運之鳳梨苗，必須先用上述同種類同濃度之藥液浸苗。

④ 堆苗跡地四週應先噴射二三%「阿特靈」乳劑五十倍水溶液，浸苗後再全園噴藥一次。

本社 配售 美國 優良 種公 鷄

農復會畜牧生產組從美國引進的優良種鷄蛋，已經在新化畜產試驗所孵化。所有母鷄，準備留為育種之用；一部份公鷄優良配種者改良種。配種辦法如下：

- (1) 純漢縣 (二個半月) 尼德勒種 (Nedler) 四十隻 哈巴種 (Hubbard) 六十隻 每隻五十五元
 - (2) 蘆花 (二個半月) 巴默里種 (Parmelee) 六十隻 每隻五十五元
 - (3) 來杭 (一個半月) 柏斯種 (Boris) 一百一十隻 每隻四十五元
- 申請手續

(1) 四十九年四月七日以前，寫信或直接到「豐年社」登記：①現在飼養的鷄種與隻數，②所需公鷄種類，③所需隻數。寫信登記時，請在信封上註明「鷄種」字樣。

(2) 本社在截止登記後三日內，通知各人所能配到的隻數。

(3) 出售日期：四月十五日下午及十六日上午。

(4) 申請者接到本社通知後，請準備現款與鷄籠，在指定時間內，親自到本社購買，不得要求寄送。

(5) 中南部的讀者，可就近向「臺南縣新化鎮臺灣省畜產試驗所」洽詢購買。

⑤ 缺水地區，除澆苗照辦外，可於種植後(於當年雨期末結束前)以〇·五%「巴拉松」粉劑，撒於鳳梨根部，每株三公分，次年四月至五月間再撒一次，並於乾旱期中(十月至次年四月)用四〇%「阿特靈」可濕性粉劑防蟻，每公頃五公

斤。

鳳梨萎凋病是由鳳梨粉介殼蟲媒介傳染的，防治方法同上。

原來的防治方法，只有前面三項。為了加強防治工作，今年增加了第四項。同時為了缺水地區的方便，在第五項內規定以粉劑代替水溶液的辦法。

菸草白粉病

用「可利生」一千至一千五百倍水溶液，於發



部根果鳳害為虫殼介粉

病初期噴射一次，以後等病微再度出現時，噴射一次或兩次。每次每公頃一千至一千二百公升。

甘蔗露菌病

① 不種易感病之品種(如PT四三一二及F一四一等)。

② 種植抗病之品種。

③ 澈底拔燒病株。

④ 不用病株作苗。

蔬菜露菌病

十字花科蔬菜，如蘿蔔、白菜、芥菜、大心菜、甘藍、花菜等露菌病的發病初期，噴射「大生七十八」或「大生二十二」四百倍水溶液，每隔七天一次，連續三十四次，至收穫前七天停止。

瓜類白粉病

發病初期，噴射「可利生」一千倍水溶液，每隔十天一次，連續二次，至收穫前七天停止。