


的防除軟蟬。

三、最有效的藥劑

根據我們的試驗，複聚乙醛 (Metalehyde) 是防治軟蟬的唯一有效藥劑。通常用複聚乙醛十五公分，與米糠二、二五公斤混合，撒佈在菜園，就可以驅除軟蟬，每分地只需混合藥劑二、二五至三公，但在菜園出入的地方，不可使用。

據嘉義農業試驗所最近的試驗結果認為，山德士公司出品的「蝸立殺」對驅除蝸牛很有效果，「蝸立殺」的有效成分為複聚乙醛，所以也可以用來防除軟蟬。

「蝸立殺」淡灰色，「條狀」含有百分之六的 Metalehyde。在菜園內的有效期間達三星期，每平方公尺菜園施用十至十五粒 (依受害情形增減)，每公畝約需一百公分。



葉菜白的害被

在三、四月間軟蟬繁殖時期與蔬菜生育初期使用，較為經濟有效。「蝸立殺」不要與飼料混合使用，以免毒殺鷄鴨等。

美國加州農業化學公司出品的「殺蝸牛劑」，也含有複聚乙醛，一樣可以用來防除軟蟬。

訂正啟事：

本刊第十卷第六期第七頁「花菜苔改稱青花菜」一文中，「大巴士頓」應更正為「大波斯頓」。

△農業小智識▽

△稻田混有不純的稻株，不但會影響收刈的日期，而且會降低米谷的品質。假如採種田混雜不純的稻種，影響更大。所以，稻田的不純稻株，應該在未收刈以前拔除，做適當的處理。

△採種田混有不純稻株時，應在抽穗齊期，還沒檢查田間以前拔除清潔。拔除的稻穗，可帶回家做鷄鴨飼料。

△一般稻田混有不純稻株時，應在黃熟期以前連根一起拔取，另外種植在田角，等到成熟後分別收刈，以免混雜。(來)

△柑桔因枝條太直不結果，可壓彎糾正。但是這個工作是在早秋舉行，效果顯著。假如在春夏季壓枝，在枝的彎曲處會抽生強壯粗大的徒長枝來。(護)

農友們!!

種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種，若選錯品種種植者，就是一生的錯誤。第三、一來費精神，二來了本錢。三來鎖土地。各位農友們!!如希望種植荔枝、若無氣味者，即請撥稿來敝園參觀指教、無任歡迎。

林永旭荔枝苗本園



對於顧客優待辦法請看豐年第九卷一、二、三期敝園之廣告

荔枝苗現有尺數
4 3 2 尺上上、下下
7 6 尺上上、下下
10 9 8 尺上上、下下
以上、下

◎新時代要栽培新品種

- 蕃茄各種，加州大甜椒，矮性大粒皇帝豆，特選幼葉目豆，大條粗米苦瓜子，九龍種子，長匏種子，特選刺瓜，大條冬瓜，大木瓜金瓜子，小木瓜型金瓜子
- 新品種：七葉田用目瓜(菜瓜)橙黃色豐丹、太陽西瓜、密寶西瓜、崎頂紅肉西瓜、瓜子西瓜、芳茂採種、長朋脂茄子、極早生矮性木瓜子、清江白菜子、落花生臺農一號
- ◎農業科學化，要使用特效新農藥。
- ◎本園齊備中外各國名農藥，禽畜藥供應。
- ◎農業機械化要使用優良堅固耐用農器具。
- ◎芳茂特製噴霧器。

芳茂種苗園

園主 顏柳
門部：臺中市第二市場內
採種場：臺中市南區樹義里

世間良藥 肺癆

散肺療

主治

肺癆、吐血、止咳、痰黑清肺、化痰、補虛、肺的各種病症等。

內政部許可牌衛衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

腳濕靈

主治 氣病 腳趾濕

不計年久

擦用後即止

癢癢病為腳趾濕氣病、專門治療藥

內政部許可牌衛衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品

(四八)北市衛四廣檢字
第四〇五九號

