

的防除軟蠶。


三、最有效的藥劑

根據我們的試驗，複聚乙醛（Metaldehyde）是防治軟蠶的唯一有效藥劑。通常用複聚乙醛十五公分，與米糠二·二五公斤混合，撒佈在菜園，就可以驅除軟蠶，每分地只需混合藥劑二·二五至三公分，但在家禽出入的地方，不可使用。

據嘉義農業試驗所最近的試驗結果認為，山德士公司出品的「蝸立殺」對驅除蝸牛很有效果，「蝸立殺」的有效成分是複聚乙醛，所以也可以用來防除軟蠶。

「蝸立殺」淡灰色，「條狀」含有百分之六的 Metaldehyde。在菜園內的有效期間達三星期，每平方公尺菜園施用十至十五粒（依受害情形增減），每公頃約需一百公分。

「蝸立殺」的有效成分是複聚乙醛，所以也可以用來防除軟蠶。



被害白菜葉

在三、四月間軟蠶繁殖時期與蔬菜生育初期使用，較為經濟有效。「蝸立殺」不要與飼料混合使用，以免毒殺鴨鵝等。

美國加州農藥化學公司出品的「殺蝸牛劑」，也含有複聚乙醛，一樣可以用來防除軟蠶。

訂正啓事：

本刊第十卷第六期第七頁「花菜苔改稱青花菜」一文中，「大巴士頓」應更正為「大波斯頓」。

- △稻田混有不純的稻株，不但會影響收刈的日期，而且會降低米谷的品質。假如採種田混雜不純的稻種，影響更大。所以，稻田的不純稻株，應該在未收刈以前拔除，做適當的處理。
- △採種田混有不純稻株時，應在黃熟期以前沒檢查田間以前拔除清潔。拔除的稻穗，可帶回家做鷄鴨飼料。
- △一般稻田混有不純稻株時，應在黃熟期以前連根一起拔取，另外種植在田角，等到成熟後分別收刈，以免混雜。（來）
- △柑桔因枝條太直不結果，可壓彎糾正。但是這個工作是在早秋舉行，效果顯著。假如在春夏季壓枝，在枝的彎曲處會抽生強壯粗大的徒長枝來。（謨）



林永旭荔枝苗本園

對顧客
優待辦法
請看豐年
第九卷一
二、三期
啟園之
廣告

芳茂園

園主
顏卿
園

園

世間病藥良方

散肺療

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可號臺衛成字第六七一號



香港腳專門治療藥出現

靈濕腳

治氣病

主 濕久後即止
脚計年用擦藥

瘡癆病為脚趾濕氣病、內政部許可臺衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

新製藥所出品

(四八)北市衛四廣檢字第4059號

農業小智識