的防除軟蝓。

三、最有效的藥劑

根據我們的試驗，複聚乙醛（Metaldehyde）是防治軟蝓的唯一有效藥劑。通常用複聚乙醛十五公分，與米糠二·二五公斤混合，撒佈在菜園，就可以驅除軟蝓，每分地只需混合藥劑二·二五至三公分，但在家禽出入的地方，不可使用。

據嘉義農業試驗所最近的試驗結果認爲，山德士公司出品的「蝸立殺」對驅除蝸牛很有效果，「蝸立殺」的有效成分是複聚乙醛，所以也可以用來防除軟蝓。

「蝸立殺」淡灰色，「條狀」含有百分之六的Metaldehyde。在菜園內的有效期間達三星期，每平方公尺菜園施用十至十五粒（依受害情形增減），每公畝約需一百公分。

在三、四月間軟蝓繁殖時期與蔬菜生育初期使用，較爲經濟有效。「蝸立殺」不要與飼料混合使用，以免毒殺鷄鴨等。

美國加州農藥化學公司出品的「殺蝸牛劑」，也含有複聚乙醛，一樣可以用來防除軟蝓。



被害的白菜葉

：訂正啓事：

本刊第十卷第六期第七頁「花菜苔改稱青花菜」一文中，「大巴士頓」應更正爲「大波斯頓」。

△農業小智識▽

△稻田混有不純的稻株，不但會影響收刈的日期，而且會降低米谷的品質。假如採種田混雜不純的稻種，影響更大。所以，稻田的不純稻株，應該在未收刈以前拔除，做適當的處理。

△採種田混有不純稻株時，應在抽穗齊期，還沒檢查田間以前拔除清潔。拔除的稻穗，可帶回家做鷄鴨飼料。

△一般稻田混有不純稻株時，應在黃熟期以前連根一起拔取，另外種植在田角，等到成熟後分別收刈，以免混雜。（來）

△柑桔因枝條太直不結果，可壓彎糾正。但是這個工作是在早秋舉行，效果顯著。假如在春夏季壓枝，在枝的彎曲處會抽生强壯粗大的徒長枝來。（謨）

農友們!! 種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種類，若選錯品種種植者，就是一生的錯誤。第三、一來費精神，二來了本錢。三來鎮土地。各位農友們!!如希望種植荔枝、若無氣嫌者，即請撥駕來敝園參觀指教、無任歡迎。

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號

林永旭荔枝苗本園

對於顧客優待辦法請看豐年第九卷一、二、三期敝園之廣告

荔枝苗現有尺數

2尺上、下　5尺上、下　8尺上、下
3尺上、下　6尺上、下　9尺上、下
4尺上、下　7尺上、下　10尺以上

◎新時代要栽培新品種
蕃茄各種，加州大甜椒，矮性大粒皇帝豆，特撰幼葉目豆子，大條粗米苦瓜子，丸匏種子，長匏種子，特撰莉瓜子，大條冬瓜，大木瓜金瓜子，小木瓜型金瓜子
新品種：七葉田用目瓜（菜瓜）橙黃色豐丹トマト，太陽西瓜，密寶西瓜，崎頂紅肉西瓜，瓜子西瓜。
◎芳茂採種!!長胭脂茄子，極早生矮性木瓜子，清江白菜子，落花生臺農一號
◎農業科學化，要使用特效新農藥。
◎本園齊備中外各國名農藥，禽畜藥供應。
◎農業機械化要使用優良堅固耐用農器具。
◎芳茂特製噴霧器。

芳茂種苗園

園主　顏卿柳

郵滙臺灣四八一一號
門市部：臺中市第二市場內
採種場：臺中市南區樹義里

世間藥良病癆肺

療肺散

主治
肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。
內政部許可肆臺衛成字第六七一號

現出藥療治門專脚港香

脚濕靈

主治
脚趾濕氣病
不計年久
擦用後即止

（四八）北市衛四廣檢字第四〇五九號

療癒病為脚趾濕氣病、專門治療藥
內政部許可臺衛成字第三七三號

各地藥房均售
各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號
說明書函索即寄
臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品