


# 農 業 智 識

## 楊桃為何不開花？

栽植太密，是楊桃不開花結果的一種原因。楊桃栽植距離至少要十五尺，假如栽植太密，樹就徒長，不會開花結實。

灌水太多也是楊桃不結果的一種原因。每次土乾時就灌水，結果使楊桃徒長不結實。楊桃是深根性果樹，不需要常常灌溉，秋冬期間，樹漸進入休眠狀態，開始形成花芽的時候，更不宜多灌水。

楊桃在本省栽培，常易徒長而不結果實，這時宜在雨季將終了時，實施斷根或樹幹刻傷，以促進結果。(致)



## 「紅柿」與「水柿」

「紅柿」「水柿」是柿果用不同的脫澀方法所製成的不同產品。紅柿肉軟爛，所以又叫「爛柿」。水柿肉硬脆，所以又叫「硬柿」。

凡是果形大而整齊，色澤鮮艷，果肉厚，肉質緻密，甘味多，汁液多，而種子少的品種，就是優良品種。能脫澀成良好的「水柿」，也能脫澀成良好的「紅柿」。(致)

## 嫁接用接蠟的配製

在炎熱地區(如臺灣)使用的接蠟，應依下法配製：稱一百公分松香，打細成粉末，再稱一百公分蜂蠟，切成薄片。用鐵罐一個，先放入蜂蠟，在火上熬融，再慢慢放入松香粉，不斷攪拌，到完全熔融調勻後離火即成。

使用時須加熱，但太熱會灼傷樹體，須注意。

又松香和蜂蠟都容易着火燃燒，熬時溫度太高，或熬煮太久，易於着火，必須小心。(護)

## 「蘋婆」原產我國

「蘋婆」(ピンボン)是我國大陸南方原產的一種亞熱帶果樹，春天開花，果實在八月間成熟。食用部分是種子。外皮黑色，仁黃色，炒熟後或煮熟後供食。含很多澱粉，稍有苦味，在本省多用來煮紅燒肉。(護)

## 夏油乳劑不能連續使用

花蓮縣富里鄉黃新與農友來信說，他的柑桔發生煤煙病，在二星期前噴射「夏油乳劑」加「馬拉松」。不知是因天氣不佳或倍數太多，煤煙還沒完全脫落。在這種情形下，是否可以再噴「夏油」？假如如其發生，會不會影響開花結果？

「夏油乳劑」的正當稀倍數是三十五到四十倍，如果用「高級夏油」可稀釋六十倍。稀釋倍數太大，當然會減低效果。

但是煙煤病所生的黑色煙煤，在大雨後才會慢慢被洗脫，「夏油乳劑」噴後不能使煙煤脫落。

現在你應該檢查柑桔樹葉上的介殼蟲，是否大部分或全部死去，如果是的，表示「夏油乳劑」的噴射是有效的。

「夏油乳劑」不能連續使用，以防引起藥害，一年只用一—二回，隔六個月後才可以再噴。

煙煤只影響葉片的光合作用，太多時當然使樹勢衰弱。少量時不會影響開花結果。假如檢查結果，大部分介殼蟲沒有死去，可用8E「馬拉松」稀

授教系學醫獸學大灣臺立國 薦推士博標榮劉

用請堵母的 血貧 糟食 乳舞

# 命寧安堵

越卓効功片一日一

品聖的疫肺、劑白猪子防預

廠物藥畜家春鴻

六之號八一安長鎮橋板縣北臺

號一一八三第灣臺金儲撥劃

說明書 備索