

知發病原因及其防止方法。(旗山鎮張華)

【答】：據你所說的情形，你的羊群是營養不良，並且患有內寄生蟲所致。飼養時，羊隻除在外吃草外，應補充些穀皮、米糠及豆糜等飼料，以補助其營養之不足。因為本省地區溫濕，羊隻之內寄生蟲為害甚烈，嚴重者可致死亡。在管理上，放牧地應選擇較高排水良好之處，同時應請獸醫檢查糞便，診斷蟲類給藥治療為要。

羊發生乳房炎後 注射抗生素藥劑

【問】：鄙人所飼奶羊乙隻，發生乳房內部變硬症。好像生了很多奶子在乳房內部海綿狀體的表面與裡面，由外面可摸到。二、起初好像發生輕度乳房炎，因擠奶時地會感覺痛苦的樣子。那時就有了奶子狀態了。三、曾使用金銀素，但未見效。現在奶量漸減，奶子很硬又多。是否有特效藥或治療方法？(左營曾茂林)

【答】：該病可能係由乳房炎而來，當時發生乳房炎，未加注意，且擠奶又未注意，因而引起乳房內組織結締化，成為一種顆粒性組織硬化。因發生乳房炎時，內部細菌繁殖而侵入到組織，現在只用溫水熱敷，常常輕度液聚，同時必須繼續注射抗生素藥劑(曾用金銀素或用之不當，或未繼續使用等原因)(如德尼西林、鏈黴素等類)，或可恢復。擠取之乳，最好不供飲用。(黃立羣)

防治柑桔潰瘍病 可暫用波爾多液

【問】：本人種植有八百株印仔柑(柑柳)等，至現在尚有潰瘍病。關於此病，在去年三月起每隔二十天噴四次瑞士山德士牌好寶粉，而該病仍然發生，請問現在是否有該病特效藥？(嘉義縣竹崎鄉林捷凱)

【答】：柑桔潰瘍病，目前我們正在試驗以抗生素代替不太理想的波爾多液來防治它，但是還沒有達到成熟階段。現在只好暫時使用六斗式波爾多液，在每年六至九月間該病開始發生時，每隔三十五到四十天撒佈一次來防治。(莊德榮)

柑桔園可種豆類 不要間作香茅草

【問】：我曾種植柑桔果樹二甲餘，各株間十八至二十尺，中間空地可以種香茅草否？是否影響柑桔生育？(臺東鎮林天啟)

【答】：香茅草吸收土壤中肥分的能力很強，所以種過香茅草的土地，非常瘠薄，以後再種其他作物，如非多施有機肥料，不會有好的收成。所以你的柑桔園中，不要間作香茅草，宜種豆類、蔬菜或綠肥，如果柑桔樹還小，間作鳳梨也很有利。(蔡致漢)

瘠土施肥可種李 植後三年有收穫

【問】：本人有一塊沙土，係屬旱地，擬種李仔，請問是否適宜？株間距離若干？何季可種植？種後幾年可收穫？如製李乾何種為佳，李仔是否怕旱？(臺東鎮林義進)

【答】：照來信所說，你的土地很瘠薄，而且保水力也很差，如能多施有機肥料，可以栽種李。李的種植適期是十一月下旬到二月上旬間，種植距離約1.5公尺，植後三年可有收穫。適於加工的李品種有紅肉李。一般果樹皆忌風，李亦不例外。(蔡致漢)

木瓜移植死亡率高 適宜土壤微帶酸性

【問】：一、請問種植蘇麻種木瓜，自播下種子至發芽後，是不是可以移植？其方法聽說在移植前將木瓜根切斷再培土，經過一個月後繼續開始全面移植。(豐原鎮林哲右)

二、苗圃地區是否可以種植蘇麻種木瓜？有何缺點？可否補救？(苗栗縣徐炎榮)

三、我種的蘇麻九號木瓜，有少數果肉內雖有苦味，是何原因？怎樣預防或除去？(宜蘭張立初)

【答】：一、木瓜移植主要目的在於苗圃中育苗期間距離過密，移植後生育健旺，能獲得正常發育。除高溫季節移植可以促進發根作用外，早春、秋、冬均無此需要，因為移植後死亡率甚高。如將根切斷再培土，影響生育不良，因苗圃距離過密時，宜在二子葉展開後立即移植。如欲促進發根，待苗

日本農林省岡崎種畜牧場實驗證明

ミネゲン

美耐元


理想的綜合強力礦物素

強健多產 激減廢錫 促進發育 預防啄毛 防止腳病 防止軟破卵



◎保護家禽良藥

淨重三〇〇公斤
淨重五〇〇公分



強力安雞素 (ノキサリン)

雞之球蟲症治療及預防家禽霍亂(コレラ)之預防鴨之感冒咳嗽治療，雞之赤痢(出血性下痢症)

強力寧禽片 (ヘルミノツク錠)

鷄 蛋 靈 (ワクモゾール)

好 擊 蟲 (SP オゲゾン)

日本原裝魚粉50%，65%以上

養鷄器具、鷄籠、切菜機、鷄糞乾燥機、自動給飼器

出品廠 大和化學工業株式會社 東京工場

製造元名古屋

ミネラル飼料株式會社

臺灣總代理 東盈實業股份有限公司

地址：臺北市迪化街1段42號

電話 44411・44415

藥房均有售
全省各飼料行