

鐸 振 吳——

夏茶及秋茶應等新芽生長至四、五葉才摘心。二、三年生的茶樹，每年摘心二、三次（請看左上圖）。

七點

②淺剪枝後的成本茶園應早採嫩探：上年淺剪枝面上新芽生長至第三葉開面時，立即以一心二葉爲標準，全面採摘。早採不但可以增加採摘次數及生葉收量，而且因早採芽質柔軟，也能提高成茶的品質。（請看左中圖）

③深剪枝成本茶園不採春茶：去年深剪枝的成本茶園，不採春茶。夏茶也只能輕採。假如有徒長枝，應行二段

④茶菁應隨採隨送工廠，不要在採摘籃中裝盛過多，或放置過久，以免因熱發酵，影響品質。

最好在採後立即攤放在蔭涼低濕的地方，攤得愈薄，愈不影響品質。

⑤採後應巡視茶園，看看應採摘的茶芽是否採清，以免影響下期的採摘量及採摘期。

⑥每人或每區及每日的採摘量，都應詳細登記。

⑦不同品種或不同等級的茶菁，應分別採摘，分別放置，不可混合。

最後，筆者要向製茶工廠提出下面的一點希望：

第一、各工廠收購茶菁時，應分等級訂定價格，而且級間價格相差要大，這樣可以鼓勵嫩採，防止粗摘。

第二、參考生產成本，共同擬定各地各級茶菁的最高及最低價格，共同遵守。不遵守規定的，立即取消工廠的登記證。



▲茶蠶與茶紅蜘蛛▼

茶蠶的防治：①幼蟲三齡以前

噴射三·五%魚藤精乳劑二百五十

至五百倍水溶液（在採摘後新芽未展開前使用）。②冬茶（當年十一

月至次年二月)用二五%DDT乳劑四百至六百倍水溶液噴射。

茶紅蜘蛛的防治：①採摘後無

新嫩芽展開時噴射二五「克氯苯」乳劑一千倍水溶液，每公頃一千至

一千二百公升。②儘量利用冬季（

③以噴射二次爲宜，第二次於第一次噴射後七至十五天舉行。

葡萄苗園

彰化縣埔心村黃厝巷三四號

園主 薛

用

現有苗木優美目下正當移植之期欲購者請向
速勿失良時

園主 敬白

敝園現有優
良葡萄苗木
イヤガラ種
純實豐潤
各位光臨賜
顧奈加拉種
葡萄產量豐
富收穫可靠
不論氣候溫
熱寒冷高水
低水園土均
可栽種敝園

一千九百一十一年



農友們!! 種植荔枝是農村最好的副

業。但是第一要選種。第二紫藤荔枝有十餘種類，若選錯品種種植者，就是一個的錯誤。第三、一來費精神，二來了本錢。三來墾土地。

各位農友們！如希望種植荔枝、若無氣嫌者，即請擁擠來敝園參觀指教、無任歡迎。

林永旭荔枝苗本園



對於顧客
優待辦法
請看豐年
第九卷一
、二、三
期敝園之
廣告

4	3	2	荔枝苗現有尺數
尺	尺	尺	
上	上	上	
、	、	、	
下	下	下	
7	6	5	
尺	尺	尺	
上	上	上	
、	、	、	
下	下	下	
10	9	8	
尺	尺	尺	
以上	上	上	
上	、	、	
	下	下	