

以上是三要素的需要量，實際施肥時，還需依照所用的肥料所含該要素成份計算出需肥量。

有效期間視肥料種類而定，速效肥料在一星期內見效，遲效肥料可維持肥效三至八個月。

每年施肥二次，九月及二、三月各一次。

施肥後不需要立即灌水，但如土壤太乾燥，而希望立即見出肥效時，才需要灌水。

施肥方法如為圓形施肥時，圓周直徑與溝深如下：

| 樹齡 | 圓周直徑 | 溝深    |
|----|------|-------|
| 二年 | 八寸   | 三寸    |
| 三年 | 一尺二寸 | 五寸    |
| 四年 | 二尺   | 六寸    |
| 五年 | 二尺   | 八寸—一尺 |
| 六年 | 二·五尺 | 同右    |
| 七年 | 三尺   | 同右    |
| 八年 | 三尺   | 同右    |

溝的深淺視需要而定，以淺為宜。如施用化學肥料，份量很少，溝可淺。如施用有機肥料，份量多，溝宜深，始能掩蓋全部肥料於土面下。太靠近樹幹施肥，切斷根群太多，會阻碍樹的發育。(護)

## 少見的變形洋蔥

高雄縣林園鄉黃土木農友試種洋蔥，發現奇形的葱球(請看下图)，

約有百分之五十。


黃農友的土地是砂質壤土，在百美豆收穫後種植洋蔥，每分地基肥用量：堆肥約四千五百台斤，氮素(硫酸安)四十台斤，磷二十台斤。追肥用氮素二百三十台斤，磷肥一百三十台斤，鉀二十台斤；氮磷肥分三次施用，鉀肥在最後一次追肥時施下。

全生育期灌溉四次，每次灌水後，等地面乾燥時行中耕。

從黃農友的耕作情形可以看出，他的鉀肥施用時間過遲，遂使將近休眠成熟的葱球裏邊的幼莖(由鱗片集成的假莖)，突然伸長，這是洋蔥變形的原因。

鉀肥是一種莖肥，可以促進莖部伸長。這樣變形的葱球，是很少見的。(宗雄)

變形的葱球



美國原裝 · 現貨供應 · 歡迎採購

好速牌阿特靈可濕性粉劑

ORTHO Aldrin 40 Wettable

防治土壤害蟲



好速牌富特靈乳劑

ORTHO Phosdrin 2 Emulsive

防治蔬菜、茶樹等害蟲

好速殺50%水和性粉劑

ORTHOCIDE 50 Wettable

防治蔬菜、柑桔、瓜類等病害

好速福乳劑

ORTHOPHOS 4 Emulsive

防治水稻、鳳梨等害蟲

好速牌地特靈乳劑

ORTHO Dieldrin 1.5 Emulsive

防治香蕉象鼻蟲、柑桔星天牛等

總代理：嘉農股份有限公司

臺北市信陽街31號

電話：二七九二二