



屏東縣落葉期中期的苦楝林

苦楝造林收益迅速 五年後可開始除伐

· 林 文 鎮 ·

楝樹又稱苦楝或苦茶樹，在臺灣散生海拔九百公尺以下的平地及山麓地帶。近年來，省府農林機構及農復會，在屏東、臺東、高雄等地，推廣楝樹造林，成績很好，證明楝樹在本省中南部及東部地區，是很有希望的樹種。

楝樹皮及果肉，可作驅蟲劑，果實作藥，有收斂及止痛的功能。在臺灣的通常十五至二十年生的楝樹，平均生長量，五年生樹高八·三公呎，胸徑九·七公分。十年生樹高十四·四公尺，胸徑二十二公分。二十年生樹高二十·五公尺，胸徑四十二公分，每株材積約達一立方公尺。楝樹在臺灣潤葉樹造林樹種中，可以說是生長最迅速的樹種之一。楝樹對氣候及土壤的適應性很強，能耐潮濕及酸性土壤，尤其在溫暖地帶的濕潤肥沃的砂質土壤中，生長特別優良。

楝樹材年輪分明，木理優美，材質堅軟適度，容易加工。乾燥迅速，能耐白蟻的侵害。可供建築及製造傢具、木履、箱籠、靴帽型、棺木等用。也可以用做薪炭材。苦楝的根

可以砍伐利用板材，但造林後五年即可開始「除伐」，生產薪炭材。以後每隔五年可間伐一次。因此楝樹林在主伐以前，已有相當的中間收益。（參看本刊九卷廿四期二十頁）

楝樹的造林及經營要點

- ① 造林適期二至四月，直播造林或苗木造林均可。
- ② 種子播種前，應先將果實浸水三至四天，混木灰洗去果皮果肉，以促進發芽。
- ③ 每公頃播種四千至五千株（穴）。如直播造林時，每穴播種三至五粒。
- ④ 播種後應及時刈草及間拔，又最初一至三年間，注意除去側芽。第四至七年，每年「須行打枝」，以免分枝過多，影響生長。
- ⑤ 為減免蟲害，不要造大面積的楝樹林，不要與柑桔類

種在一起。最好與相思樹等配合，造帶狀或團狀混交林。

⑥ 楝樹砍伐後，每一根株，選留健壯萌芽條一至二條，培土保護根部。

附註：需要苦楝種苗，可向鄉鎮公所申請，免費配給。

油楝和糠楝

臺灣的楝樹有油楝和糠楝（粗糠楝）二種，油楝的木材緻密堅硬，木理美麗而有光澤，較有價值。糠楝的木材粗而稍軟，板目有白色腐朽痕，木質較差。形態上的區別如下：

油 楝

- 葉：尖端小，葉較寬而長大，鋸齒較深刻。
- 花：脗脗圓，花淡紫色，花瓣薄而小。
- 枝：細而數多。
- 果實：晚熟，橢圓形。
- 種子：紡錘形，稜角不高。

糠 楝

- 葉：尖端小，葉細長而較小，鋸齒無深刻。
- 花：蕾細長，花淡紫色，花瓣厚而大。
- 枝：粗而數少。
- 果實：早熟，平圓形。
- 種子：圓形，稜角高。