

識知業農

香蕉花有三種

香蕉的花有三種。最早開花，子房佔全花三分之二的，稱為有效花。有效花可以結成果實，約六至十段。有效花開完了，就開少數中性花，子房佔全花二分之一，中性花只結成細短無用的果實。以後再開的是雄花，子房佔全花三分之一，雄花可以繼續開到果實採收，不會結果，應該於香蕉開花結果後約三個月，離結果果段三至四寸的地方，將雄花花苞剪掉，以免消耗養分。切口不必塗藥，但是假如將雄花花苞去得太早，同時太近果段，可能使果軸腐爛。(朱慶國)

柑桔施肥須知

柑桔樹每年施肥三次，在二月上旬(發芽前)，六月上旬及九月中旬各施一次。在開花的時候，不要施肥。假如在開花的時候施肥，因施肥而掘傷根部，常引起落花及落果。掘溝施肥時，應儘量避免掘斷大根，所以，施肥溝不要太接近樹幹，並且不可開溝太深。施有機肥料時，掘溝至多深一尺，溝的範圍在樹冠外方直下。

鳥肥的施法，與別的化學肥料不同，應先將鳥肥與潮濕土壤混合均勻，堆於屋角，十天後再連土施下。

尿素的施用量，差不多是硫酸銨的一半，假如葉面噴施，濃度為三百公分尿素加水二十四公升，噴濕全部葉面，但是應注意，尿素中含含「二縮尿」的成分超過一%，噴在柑桔葉上，常引起葉尖變黃，葉片早落。

(蔡致謨)



幹樹近靠太要不溝肥施

大生七十八 (DITHANE Z-78) 可濕性粉劑可防

止大豆銹病用300—350倍水溶液，每公頃800—1,000公升，在播種後五十天左右本病開始發生時，行第一次噴射，以後每隔七天噴射一次，共四次。又大生七十八能與安特靈乳劑混合使用，如防病與防蟲時期相同時，應於安特靈乳劑水溶液中加入大生七十八。兩種藥劑混合方法是：在一〇〇公升安特靈乳劑水溶液中加入大生七十八可濕性粉劑280—330公分。

大生七十八亦可防止小麥銹病，柑桔象皮病及黑星病，菸草白星病及赤星病，一般蔬菜炭疽病，露菌病，疫病，紫斑病及銹病。

大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防止西瓜、胡

瓜、番茄及馬鈴薯病害。並能促進生長增加產量。對番茄可增加產量至六成半。亦能防治蛛蟎。

可利生 (KARATHANEWD) 可濕性粉劑不特可防止白粉病並

可治已發生的白粉病。亦能防治蛛蟎。

開路生 (KELTHANE W) 大生七十八可濕性

可濕性粉劑專治各種蛛蟎。粉劑三磅紙袋美國原裝



臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467

郵政劃儲臺灣第2156號

函索農藥說明書附郵票四角即寄



肺癆病良藥問世

療肺散

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可證臺衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

腳濕靈

主治

腳趾濕氣病

不計年久

擦用後即止

癢癢病為腳趾濕氣病、專門治療藥

內政部許可證臺衛成字第三七三號


各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品



第四〇五九號
(四八)北市衛四廣檢字

