

山·珠·兒·豆

葉苗田

——一種優良的牧草，也是理想的果園覆蓋植物。

「山珠兒豆」莖葉柔軟，養份豐富，是牛羊豬等的優良牧草，同時也是很理想的果園覆蓋植物。

日人曾於二十年前引進本省，但是沒有廣泛應用。四十六年四月，農復會畜牧生產組組長呂豪華先生自菲律賓引進大批種子，在各地試種，成績很好。

新化畜產試驗所去年曾採種子五十公斤，今年又採種一百五十公斤，都早為各農業機構訂購一空。今年該所擬大規模種植，明年春天可大量供應農友需求。日前有興趣栽培的農友，請照次頁贈送辦法，寫信向本社要種子。

一、適宜地區很廣

「山珠兒豆」適宜栽培地區，與熱帶葛藤一樣，凡是可種植木瓜、柑桔、椰子、香蕉，與鳳梨的地區，都可以栽培。

多沙瘠薄，或鹼性重的土壤，較不適宜。過濕或排水不良的土地也不好。

在酸性土壤上也可栽培；在北部埔心臺北牧場及茶葉試驗分所的紅土臺地，「山珠兒豆」仍能生育得很好，這就是一個證明。

二、春季播種最好

「山珠兒豆」普通用種子繁殖，平地行距〇·

八至一·〇公尺，點條播，株距〇·二至〇·二五公尺，每公頃需種子二至二·五公斤。

在坡地應作等高線播種，或作橫條間栽，行距宜縮小為五十至六十公分，每公頃用種子四至五公斤。

要栽培「山珠兒豆」的土地，必須充分耕耘，去除野草根株，使土壤充分膨軟疏鬆，並施用若干磷鉀肥。每公頃施磷肥三百至四百公斤，鉀肥一百至一百五十公斤。

通常在春季或稍濕潤季節播種，春季是最好的播種季節。

不可在雨季播種，以免種子流失或腐爛。在中部可在九至四月，南部自十至五月間播種。

播種前處理種子，可以提高發芽率。將種子在熱水中浸八至十二小時稍涼乾後播種；或用十至二十%濃度硫酸處理十五至二十分鐘，再用清水洗淨涼乾後使用。


「山珠兒豆」的初期生育緩慢，應除草二至三次。到四個月以後雜草就不易為害了。

種子缺乏時，可用具有三個節的匍匐莖扦插繁殖，不論部位，成活率都可達百分之七十至九十。

三、可以混合栽培

「山珠兒豆」可與「天竺草」，「蔓葛草」，

CLINTON ENGINE




引擎大王

克林頓引擎

美國最出名，最省油最合農業機械的引擎，如耕犁機、脫穀機（機器桶）抽水機、運糞車等用途甚多。

牽引式耕犁機大王

美利鐵牛



日本製最理想，最便宜，最實用，耕犁機出現了目前進四段後退二段，運糞力二千五百斤以上，有二段耕犁。現貨不多先訂為先，歡迎迅速訂購，勿失良機。有各種規格製品適合臺灣耕作。

說明書目錄函索即奉寄

臺灣總代理：巨豐貿易有限公司

地址：臺北市昆明街一九號
電話：三〇二九二 三二八一四

◎募集各地方各縣鎮經銷店

「拍拉草」，「阿拉鹿草」，「糖蜜草」，「百慕達草」等間作或混植，但是應先種植「山珠兒豆」三至四個月，生育繁茂後，再種植上列草苗。

山坡地作放牧地時，以「山珠兒豆」間作混作，是最理想的，行距一至一·二公尺。

四、適於放牧青刈

「山珠兒豆」是很好的牧草。本省南部乾濕季很明顯，乾旱的冬季，就是枯草期，果園間作或單作

