

剝除 甘蔗 枯葉 注意 五點

— 麟 瑞 洪 —

剝除甘蔗枯葉，可以防止甘蔗因豪雨強風而引起的倒伏，也可以減少火災的危險，但是在剝葉時，必需注意下列事項：

① 地力中上，生育良好，每公頃原料甘蔗產量估計可達十萬公斤的蔗園，剝除枯葉的效果較好。
② 剝葉的主要作用為減少倒伏。事實上，甘蔗倒伏以後，很難剝葉。所以，剝葉必須在甘蔗倒伏以前舉行。本省早植甘蔗生長至翌年七月以後，株高已達三、四公尺，此時如遇連續降雨，土層透濕，只要有少許強風，就可引起倒伏。所以剝葉時期應不遲於七月。為便利工作，常在最後一次培土（五月）時先剝一次。普通剝這二次就可以了。也有人在雨季後加剝一次（如仍未倒伏）。至十月以後，甘蔗生長變緩，而且多已自然倒伏，就沒有必要，同時也不可能再剝了。

③ 剝葉的方法必需正確，所有已經完全乾枯的老葉，連帶葉鞘，從蔗莖基部順次向上剝除。至於操作，雖可相當粗放，但是絕對不可誤剝青葉，並應避免人為的損害。

④ 山地地下水位較低，除了排水不良的蔗園，只要能够注意誘殺野鼠，所有剝除的枯葉，都可置於畦底，保護表土。到了雨季末期，枯葉已經腐爛，在上面每公頃加施氦氮化鈣（黑肥）一百五十公斤，就可促進枯葉迅速分解，增加蔗園的有機物質。

⑤ 平地蔗園剝除的枯葉，應全部搬出製造堆肥。但在土質粘重而目對排水確實無碍的地方，剝下的枯葉也可放置畦溝的一邊，但是應嚴格注意鼠害。



農業小知識

李登元

△乾牛糞含有維他命B₁₂，而有促進生長的效果，但在本省很少採用。最好是在攝氏四十度下烘乾應用，但以太陽晒乾也可以。

△樹薯含氰酸，有毒。晒乾時，大部份氰酸揮發，所以用晒乾的樹薯簽餵豬，是不會中毒的。假如不晒乾，應將樹薯簽浸水過夜，使大部份氰酸浸出後，煮熟餵豬，以免中毒。

△餵豬飼料中，滲入木瓜一半，可以免給青飼料。

藥農



牌士德山士瑞

著名 世界

一、益加津—Ekatin—防治蚜蟲，紅蜘蛛等最新有效劑可代替馬拉松乳劑，而得兼治因使用馬拉松引發之紅蜘蛛等蟲害。防治：柑桔黃龍病，棉花、大豆、落花生、蔬菜等之蚜蟲，紅蜘蛛等如每隔二—三星期撒佈一次連續使用則可達到防治目的。

特點：藥效長可維持二—三星期，比馬拉松藥力廣大。

二、殺也特—Thiovit—最新科學方法製成石灰硫磺合劑之殺菌殺蟲劑。

防治：白粉病，凡菸草，蕃茄，馬鈴薯，西瓜，甜瓜，木瓜，花卉柑桔類瘡癬病，象皮病，油脂病，銹壁蟲，紅蜘蛛，大豆，菜豆，茄子，瓜類等病蟲害防治均有顯著如與益加津同時噴用效能尤大。特點：比石灰硫磺效能大五—一〇倍，價格低廉不損傷噴霧器。

三、好寶粉—Copper, Sandoz—

防治：水稻稻熱病，柑桔類砂皮病，潰瘍病，瘡癬病，黑星病等葡萄，露菌病，黑豆病，茶，茶餅病，瓜類，露菌病，炭疽病，蔓枯病，蕃茄，疫病，棉花，角斑病，薄荷，銹病，白星病，菌核病等效能廣大。

特點：藥效長，可保持三—四星期間藥效

四、巴拉松五〇—Ekatox50 含巴拉松五〇%乳劑

特點：原液淡藍色，稀釋後清白，成分標準，殺蟲力強大。

五、蝸立死—Ariotox—殺蝸牛蝸蟲

每平方公尺撒佈一〇—一五粒，蝸牛自會前來就食立死，為果樹苗，菜園，花園等防治蝸牛侵害之最有功效。

瑞士山德士農藥廠駐臺代表處—台北郵箱八七八號

臺灣總經理處 簡泰隆行

桃園經銷處 裕農產社

臺中經銷處 吉本農畜用品社

臺南經銷處 蓬萊農業資材行

屏東經銷處 嘉興行

屏東市廈門街六四號

全省各地青果合作社，農藥，種子行均有出售

說明書附郵二角向臺灣總經理處索取即寄