

農友知識

認識颱風防範颱風

每年五月至十一月，臺灣本島或附近海面，都要好幾次受到颱風的嚴重威脅，農作物難免遭受或多或少之損害。

颱風是一種天災，很難完全躲避，我們只有想辦法把損害減至最低限度。颱風對於各種作物的損害，是以直接的風害為主，其次才是雨害。

最基本的防風辦法，就是每一個人都對颱風正確的認識，大家協力同心，事前採取適宜的措施以減輕損害。

下面所述各項防風防雨的對策，是各地農友可以做到的。

① 選種抗風性較強品種的作物。

② 迎風耕地多種防風林，迎風海岸多造防風堤。

③ 注意合理施肥，使作物加強抗風性。

④ 調查本地風害起訖時期，在可能範圍內，調整栽培時間，避免損害。

⑤ 密切注意氣象機關的颱風或強風警報（報紙、廣播、信號），權宜決定應否提前收穫作物。

⑥ 注意本地風向與風力，妥善安排樹木的支柱支架。

⑦ 風季中耕地預行深耕壅土。

⑧ 時常檢查排澆水系統，以防水害。

⑨ 平時注意修剪樹木，以防風害。

⑩ 風雨過後，速即補行施肥和防治病蟲害工作。

⑪ 無法挽回生機的作物，儘速拔除或改種其他作物。

本省除颱風外，冬季還有強烈的東北季風，沿海一帶冬季風的風力也可達到每秒二十公尺以上。此種季風且可控制臺灣冬季的氣候，對於本省

農業的壞影響相當於夏季的颱風，而且東北季風持續吹刮的時間還比颱風為長。

季風風速達每秒五公尺時，即增加農作物的蒸發，使它發生乾枯的現象。如達每秒十公尺時，即可迫使水稻傾覆脫粒，甘蔗折莖裂葉。


我們對於季風的防範，可以應用預防颱風損害的種種方法。（倫彬）

赤星椿象與天敵

臺中縣龍井鄉陳永德農友，他在今年元月，在園子裏發現一些紅色的昆蟲，身上有白點，腹部有白圈，大的有雙翅，群居洞穴。有一次他看見它們搬着一粒食物，一隻紅螞蟻出來向它搶，一搶即去，似是弱者。

陳農友

寄來的標本，經鑑定是二種不同的蟲子。體小前翅上有一小黑點的是害蟲，叫做赤星椿象，為害棉等錦葵科植物的花果。體大而紅色無黑點的，是赤星椿象的天敵，插入針狀口器於椿



(右及中) 敵天的它與 (左) 象椿星赤

國立臺灣大學獸醫學系教授 劉榮標博士薦

用請猪母的 血毒 糟食 乳毒

命寧安猪

越卓功效片一日一

品聖的疫肺、痢白猪子防預

廠物藥畜家春鴻

六之號八一安長鎮橋板縣北臺

號一一八三第灣臺金備撥劃

說明書 備索