象體內，吸收汁液而殺死椿象。（陶家駒）

甜苦魯冰的區別

甜種魯冰與苦種魯冰的形狀很相似，一般人多不容易區別，較容易的方法，是從「花萼尾狀附屬物」的顏色辨別。苦種的是濃綠色的，甜種的是灰白色。在甜種魯冰田裡發現有苦種混雜時，應立刻拔除。（吳振鐸）

甜橙苗木應否有刺？

用種子播出來的柑橘類實生幼苗，都是有刺的。嫁接過的苗木，除檸檬外，都是沒有刺的。但一樣是嫁接苗，例如在幼小時發育十分旺盛，也會產生有刺的枝梢來，但以後發育逐漸緩慢，進入結果年齡時，所產生的枝梢是沒有刺的。

如果嫁接的晚侖西亞橙，到了結果年齡而仍生有刺的枝梢，那是在繁殖的時候，誤接了有刺系統的枝穗。有刺的甜橙樹，管理採收都麻煩。（謨）

軟殼鷄蛋

產卵鷄在開始產卵時，常有一、二次產軟殼蛋。這是因爲開始製蛋的經驗不够的緣故，二、三個月後就可恢復正常。

但有些是因爲維他命丁的缺乏而引起的。缺乏維他命丁時，雖然有鈣的供應，也無法利用爲製殼的原料。

鷄隻經常與日光接觸，就不會缺乏此種維他命。鷄隻如果關在室內飼養，飼料中應加〇·三%魚肝油，補充維他命丁的不足。（李登元）

大生七十八 (DITHANE Z-78) 可濕性粉劑可防止 **大豆銹病** 用300—350倍水溶液，每公頃800—1,000公升，在播種後五十天左右本病開始發生時，行第一次噴射，以後每隔七天噴射一次，共四次。又大生七十八能與安特靈乳劑混合使用，如防病與防蟲時期相同時，應於安特靈乳劑水溶液中加入大生七十八。兩種藥劑混合方法是：在一〇〇公升安特靈乳劑水溶液中加大生七十八可濕性粉劑280—330公分。

大生七十八亦可防止小麥銹病，柑桔象皮病及黑星病，菸草白星病及赤星病，一般蔬菜炭疽病，靈菌病，疫病，紫斑病及銹病。

大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防止西瓜，胡瓜，蕃茄及馬鈴薯病害。並能促進生長增加產量。對番茄可增加產量至六成半。亦能防治蛛蟎。

可利生 (KARATHANEWD) 可濕性粉劑不特可防止白粉病並可治好已發生的白粉病。亦能防治蛛蟎。

開路生 (KELTHANE W) 可濕性粉劑專治各種蛛蟎。

大生七十八可濕性粉劑三磅紙袋美國原裝

臺灣總代理 青象貿易有限公司
臺北市中正路1756號三樓 電話：27467
郵政劃儲臺灣第2156號
函索農藥說明書附郵票四角即寄

「沙發美星」
注射液 33⅓%
'SULPHAMEZATHINE' 33⅓%

ICI
英國卜內門公司
各種獸醫藥品

• 功效可靠
• 使用簡便
• 一經採用
• 保證滿意

專治
禽畜之腸炎
肺炎，球蟲病
及各種
細菌性疾病

現貨總經銷
永生西藥行
台北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

強健又多產
台南種雞園的初生雞
訂購請早辦化
全年（夏季無停）
日本農林省 岡崎系來克享
日本農林省 大宮系來克享
美國 杜拉蓮系來克享
其他 {蒲花紐漢布沙 一代維交種等



說明書函索即寄
夏雛打折優待
兼營各種養鷄器材
台南種雞園
園址：臺南市東區衛國街五號 電話：4501號
郵政儲帳號南30222號
分場：臺南市東區裕農路後甲