

：純種種漢西剛生蛋母雞。②病徵：無病徵突然跳起倒斃，死後冠呈淺紅色失血狀，肛門外凸。③解剖：血液為紫黑色稀薄狀，卵外附紫色血，肝臟、脾臟，呈深紫色肥大，腸無病徵，肺外血深紅色，瓣較大。(臺北縣景美王碧瑛)

【答】：據你所說的情形，你的純種西母雞之死亡，可能是患急性家禽霍亂病致死。該病急性死亡甚速，亦可能毫無病徵發現。貴場如此病流行，應定期舉行家禽霍亂疫苗預防注射。該病早期應用家禽霍亂血清注射治療成效尚佳。(李登元)

番茄植後噴藥

不會發生藥害

【問】：番茄定植後，尚未五天就噴大生(78)是否有害？噴藥經過12小時是否有效？現在之氣候潮濕，大部份容易患病，長期利用大生(78)噴射，是否適當，其效果如何？(苗栗縣頭份鎮劉良慶)

【答】：番茄移植後噴大生(78)不會發生藥害的，但其濃度不要超過四〇〇倍，施藥後二小時藥液如遇未乾而遇大雨時，須再噴藥。番茄的莖葉有細毛，藥液不易附着，為增強藥效應在藥液中加入些展着劑。過潮濕氣候大約每隔五到七天撤藥一次。長期噴藥是可以的，其效果必定優良。(洪章訓)

番茄使用農藥處理

乾後可施另一藥劑

【問】：番茄可否先後噴射石灰波爾多或其他農藥，然後即繼用二、四D處理。如此能否影響效果？至於重量一公分，是否與一公克相等？(花蓮縣吉安鄉徐鴻雁)

【答】：番茄使用二、四D處理前後，噴射石灰波爾多液或其他農藥並無妨礙；唯需注意使用一種藥劑時，待其乾燥後方可使用另一藥劑。先噴用波爾多液，需待波爾多液乾燥後，方可使用二、四D液，或先用二、四D液，需待二、四D液乾燥後，方可噴用波爾多液，否則會影響二、四D液之濃度，而減少效果。又一公分即一公克。(講靜哥)

馬拉巴栗是乾果

適於中南部栽培

【問】：我是山地青年，有一點事，向貴社請示。有人說，種「マラバクル」這一種菓樹，是有相當利益，請賜答下列問題：①何種菓樹？②什麼氣候適當？③在什麼地方可買種苗？④定價多少？⑤距離多少？⑥適當種植的時期。(高雄縣茂林鄉簡水生)

【答】：①馬拉巴栗(マラバクル)是一種乾果，果實像一隻檸檬，成熟後自然裂開，散出種子。一個果實內含種子約十三粒，曬乾後用火焙炒，炒熟後吃，很香脆，風味有點像花生。②此樹喜高濕潮濕氣候，適於本省中南部栽培。若在山地栽培，海拔高度不要超過三〇〇公尺。土質並不嚴格選擇，但排水必須良好。③嘉義市山子頂嘉農農業試驗所有種苗供應。④苗價免費，須具函申請，每株酌收捆苗費一角。⑤種植距離，株行距都是五公尺。⑥若在可以灌溉的地方，一、二月種植最宜。不能灌溉的地方，須待雨季種植。(蔡致讓)

桃園地區西瓜品種

以「金星」「大丸」等為佳

【問】：一在桃園地區的黃色土壤，春季種植西瓜，以何種品種較好？二、驟雨期應注意那幾種病蟲害？三、抗旱品種能適於黃色極酸性土壤的是何品種？(桃園縣李茂達)

【答】：一、以適於較粘重土壤的品種如金星、大丸等為佳。二、應注意白粉病、炭疽病和露菌病。三、西瓜都能耐極強的酸性土。耐旱品種以瓜子瓜較為適宜。(祁宗雄)

櫻花用種子等繁殖

在臺櫻花有七八種

【問】：櫻花木是怎樣培育出來的？櫻花有幾種？何處出售這種花苗？價格多少？(臺中縣豐原鎮劉金火)


【答】：櫻花木可由種子、扦插，或嫁接繁殖得到。在臺灣櫻花約有七、八種之多。大都為自生的山櫻，苗木可向臺北較大型苗商購買，高五、六尺之苗木約三〇—四〇元。(洪立)

野田式 耕耘機

現貨大批運到 歡迎參觀訂購

力異單深廉
馬優簡最低
大能轉耘格
強性運耕價

型固油想觀
新堅省理美
最最最最




ND型七馬力犁耕驅動迴轉兼用型

機身平均犁耕安定
運載重載力強無比
誠實可靠十全美
服務週到保證滿
歡迎比較參觀賜顧

臺灣總代理

宏業商行農機部

臺北市重慶北路二段四號(圓環邊)



NB型九·五馬力驅動迴轉式 ●詳細說明書函索即寄