

④翻耕拌土後再築畦種植，假如方便，在施藥耕後經一星期左右種植更理想，因施藥後經過一星期藥力發揮，可殺死大部份地下害蟲，使新長出的幼苗免受其害。


注意事項五點

①調配藥劑時，應避免藥劑與皮膚接觸，如誤觸時，應立即用肥皂洗淨。  
②撒藥時，工作人員應穿雨鞋，並帶口罩。

③撒藥及耕犁土壤拌藥時，應力求均勻週到，使每一部分都有藥劑存在，以澈底消滅地下害蟲。  
④工作完畢後，必需用肥皂洗淨臉和手脚。牛蹄也應用水沖洗，並除去粘着的土壤。  
⑤施藥後遇下雨可不必重施，但應阻止田水流失。適度下雨可促進藥劑殺蟲效力。

顯著的防治效果

①施藥後約經四、五日後，便可在地面上發現毒死的害蟲，如蟋蟀、螻蛄、蝗蟲及甲蟲類。  
②幼苗減少地下害蟲的傷害，因而可節省補植的勞費。  
③施藥後因大部份的地下害蟲被毒死，甘藷地上部也可減少害蟲為害，因而使作物生長健旺，產量品質都能提高。  
④甘藷在田裡可留存至完全成熟，或延遲收穫，而不受地下害蟲為害，間接可調節收穫期，控制市場價格。  
⑤在正常氣候下，防治地下害蟲，藥效可保持一年以上。  
⑥連續使用二、三次，可使大部份地下害蟲絕滅，每年可節省害蟲防治費，並能確保作物生長健旺。



防治地下害蟲三種農藥的調法

初生小牛的保育

——英偉王——

當小牛剛脫離母體，開始獨立生活時，因為對外界生活還不能完全適應，隨時有死亡的可能。請各位多多注意初生小牛的保育。  
小牛應在出生後三至五分鐘內開始呼吸，可是有時因種種原因，引起所謂初生牛的假死。

遇到這種情形，應先將小牛口腔及鼻孔的粘液除去，用冷水灌濕頭部及軀幹，用力按摩全身後，用毛氈包全身，再用布片浸冷水包舌。每數秒鐘向外牽出一次。  
假如已陷入窒息狀態時，除照以上方法處置外，並應速施人工呼吸。

初生小牛很容易受外界溫度的影響。所以在生產時地面應鋪敷多量柔軟乾草，嚴防寒風吹襲。  
小牛的皮膚通常多被覆着黃色不潔粘稠的胎脂，此物多由母牛舐拭乾淨。但是也有不舐拭或舐拭不充分的。此時應以乾草或毛巾代為拭淨。  
又小牛常有被包胎膜而產出。此時如母牛不自動嚼破，應趕緊用手指或剪刀破開，以免窒息。

小牛出生後一至二小時，就可使它接近母牛就乳。假如母牛因故不能哺育時，必須以人工代飼。純牛乳稍加緩瀉劑或菓子鹽便給。等胎便排淨後，就可改用純牛乳。