

最常發生的幾種雞病



球蟲病

本省小雞患球蟲病死亡的很多，病鷄翅膀漸漸斜下而喪失元氣，以至死亡。

近幾年來，

少，可是從讀者們的來信中可以看出，有幾種雞病仍然沒有完全消滅，本文是從李登元先生答覆農友們問題的信件中摘要整理而成，供給養鷄的農友們參考。

難白痢

感染。

雖白痢並無特效藥可供治療。只有請獸醫檢查種鷄是否帶有白痢菌（有帶菌的），應即撲殺。每年舉行一次檢查，就可漸漸使此病絕迹。

三

鷄與人一樣，也是會患神經病的，病鷄常將頭部插進腹間，在地下翻滾，不能進食，有人以為這是新城鵪瘧的前兆，但是與新城病無關係。


三
重
山

這種神經病，如不加治療，過些時候也會自然復原，但是常會復發。至今無特效藥可供治療。在發作時，有人用「樟腦液」肌肉注射使復原，但是仍會復發。這種病是會遺傳的，所以發現有這種毛病的鷄，應及時淘汰。

**死鷄死鴨不可食
貪小便宜誤生命**

丙皇

四
文



，坐來園家金狗阿
，多水油嫩肥肉鷄
，嘴動又箸動家大
。開開嘴(得吃)中食嫂狗

，(惜可)彩無真了死鷄母
，(殺)剖來捉要想吃狗
，喜歡真見聽狗阿
。蠻加爭菜添目今

，意熙失着如見雞
，起不見，驚無何。
。食了見雞，看母
，尋食，搜狗。

咯布

咯布（感冒）在病愈後可能復發，但仍可應用「金黴素軟膏」塗眼。為使不再發生，應在管理上注意，如保持鷄舍環境乾燥，通風良好，就不易發生此病。

白血病

鷄的「白血病」，在本省流行相當普遍。因此病為慢性傳染，容易被忽略。該病，尤其是肝腫大，比平常的大好幾倍。

此病為慢性，雖一時不死，但鷄的精力不佳，食慾不振，冠色蒼白，生蛋很少。對「白血病」，目前還沒有藥物可供治療，如發現此病，只有淘汰，避免傳染其他鷄群。

藍冠病

「藍冠病」病鷄的鷄冠，發生藍色，甚至發紫。鷄冠發紅或血紅色的表示鷄的健康情況良好。鷄冠尖端一部份變成紫藍色，但有時消失，像這種情形，多少是表示健康情況不佳，主要是消化不良的緣故，應隨時注意飼料的品質。也可用藥品治療，每隻每日口服「磺胺」二片，連續給與三日就可使消化正常。鷄冠乾枯萎縮，表示鷄要休產了。

養火鷄·收益好

高雄縣
岡山鎮
郭順直

*

我是每年以養火鷄為副業收入的。下面就是我養火鷄的方法。

孵鷄最好在農曆十一月至次年的三月間

孵鷄，因為這時候沒有蚊蟲，火鷄是最怕蚊咬的。
電燈看，有血絲的就是已經受胎，沒有的應即捨棄。


等小鷄全部孵出後，用較大的木箱分兩間，一間放小鷄，一間放母鷄，中間隔板要使小鷄可自由來往。

飼料 出生後，每日用花生餅細末，加細切的葱或韭菜飼餵。每天餵四、五次，並供給適量的飲用水。一月後可長到半公斤，以後就改用米糠青草等為飼料。

鷄舍 火鷄喜歡住在高的地方，所以火鷄舍要高，而且通風要好，內置木架供火鷄棲立。這樣飼養七個月，母鷄就可開始生蛋，土種公鷄可長到拾臺斤以上，收益很大。

新鮮蛋。

一隻母鷄每次可以孵化十五粒種蛋。在孵化一星期時應檢查種蛋是否有用。將種蛋對着



郭順直



中深未醫，鷄死後，後救獲，病生，未醫，鷄死，狗阿，勸食，可不，便小食，命生誤。



真形情後板，巧如痛肚腹，狗吐嘔噏，止病半大小，危家來忙急，有鷄死，減不病，伊忙，院入去。



真形情後板，巧如痛肚腹，狗吐嘔噏，止病半大小，危家來忙急，有鷄死，減不病，伊忙，院入去。