

咯布

咯布(感冒)在病愈後可能復發，但仍可應用「金徽素軟膏」塗眼。為使不再發生，應在管理上注意，如保持鷄舍環境乾燥，通風良好，就不易發生此病。

白血病

鷄的「白血病」，在本省流行相當普遍。因此病為慢性傳染，容易被忽略。該病病型有數種，如神經型及淋巴型。神經型的主要病狀為癱瘓。淋巴型為淋巴腫大，尤其是肝腫大，比平常的大好幾倍。

此病為慢性，雖一時不死，但鷄的精神不佳，食慾不振，冠色蒼白，生蛋很少。對「白血病」，目前還沒有藥物可供治療，如發現此病，只有淘汰，避免傳染其他鷄群。

藍冠病

「藍冠病」病鷄的冠冠，發生藍色，甚至發紫。冠冠發紅或血紅色的表示鷄的健康情況良好。雞冠尖端一部份變成紫藍色，但有時消失，像這種情形，多少是表示健康情況不佳，主要是消化不良的緣故，應隨時注意飼料的品質。也可用藥品治療，每隻每日口服「磺胺」二片，連續給與三日就可使消化正常。雞冠乾枯萎縮，表示鷄要休產了。

養火鷄·收益好

高雄縣 岡山鎮 郭順直

我是每年以養火鷄為副業收入的。下面就我養火鷄的方法。

孵鷄 最好在農曆十一月至次年的三月間孵鷄，因為這時候沒有蚊蟲，火鷄是最怕蚊咬的。

選擇種蛋時，必需注意下列的幾點：①畸形不正常的不可採用。②遭受過大振動的蛋，也不可採用。③用水洗過的蛋也不可做種蛋。

④蛋殼外表要清潔光滑，污穢的不可做孵化用。⑤蛋重約五十五至六十五公分，過重過輕都不太好。⑥蛋殼厚薄不均勻的不宜採用。⑦用手指輕彈蛋殼，發生木質聲音的是好的，發金屬聲音的為不良蛋。⑧最好用產後十天以內的新鮮蛋。

一隻母鷄每次可以孵化十五粒種蛋。在孵化一星期時應檢查種蛋是否有用。將種蛋對着

電燈看，有血絲的就是已經受胎，沒有的應即捨棄。

等小鷄全部孵出後，用較大的木箱分兩間，一間放小鷄，一間放母鷄，中間隔板要使小鷄可自由來往。

飼料 出生後，每日用花生餅細末，加細切的葱或韭菜飼餵。每天餵四、五次，並供給適量的飲用水。一月後可長到半公斤，以後就改用米糠青草等為飼料。

鷄舍 火鷄喜歡住在高的地方，所以火鷄舍要高，而且通風要好，內置木架供火鷄棲立。這樣飼養七個月，母鷄就可開始生蛋，土種公鷄可長到拾壹斤

以上，收益很好。



郭順直 農友



飯後阿狗吐嘔，
情形真痛苦，
巧者真能治，
絞如痛肚止，
死半病小大大



有雞死，
真全狗居，
險病家來，
減不伊忙，
院入去忙



中毒鷄死，
未醫鷄死，
深病不吐，
救獲生宜，
後狗命

本欄歡迎投稿：經錄用後，每則故事酬三十元，寫成閩南語聯句六十元。