

部分。節間短，橢圓形，各節長有肥大鞭芽的，才可以留下。

**施用多量氮肥**

綠竹筍與麻竹筍，愈嫩愈好吃。培土可以軟化竹筍，但為促進發育，必須施用多量的氮肥與水分，為使土壤保水力良好，還應多施堆肥。

每十公畝地的三要素施用量為氮素五十至六十公斤，磷酸十五至十六公斤，鉀十三至十四公斤。

郊區的農友多用人糞尿為主，分二次施用，每十公畝約五千斤左右，並施六百至八百公斤的堆肥，培土前還要施用四十至五十公斤的硫酸銨。

氬氮化鈣也是一種良好的肥料，但須與有機物配合使用。

施肥的深度，以較深為宜。肥料深施可使鞭根向下伸長，使培土較

容易充分軟化，而生產肥大的嫩筍。


**採筍避免切口破裂**

**採筍方法**

的好壞，影響產量很大。採收刀必需銳利，由筍的基部側面用力切斷，避免切口破裂。留下筍基

部長度，以三至四公分為宜（請看圖一）。過短時筍上附有不能食用的過硬部分，而且採收也較困難。過長時浪費可食用部分，減低收量。

普通在筍的基部（與鞭根連結的



圖二：母竹採切時，應向何方留皮。竹皮留可，的隨左如向方皮筍)  
(。售出刈收早及該應，的隨右如向方

地方) 三公分左右，都有良好的鞭芽。鞭芽可成為第二次，第三次的嫩筍，假如採法不好筍的基部切口破裂，就容易腐枯，無法再發嫩筍。


採筍後，基部的切口須暫時（十

十二小時）曝露於空氣中，使切面風乾後再行覆蓋。

**農業小知識**

△乳羊的產乳量，在第二次生產時最多。乳量

太少的乳羊，應用優良公羊交配，提高產乳能力。脾氣不好的乳羊，可一邊餵飼料一邊擠乳，以增加乳量。（翁銘統）



**農友們!!** 種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種類，若選錯品種種植者，就是一生的錯誤。第三、一來發精神，二來了本錢。三來鎮土地。

各位農友們!! 如希望種植荔枝、若無氣嫌者，即請撥駕來做園參觀指教、無任歡迎。

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號  
**林永旭荔枝苗本園**

對於顧客優待辦法  
請看豐年第九卷一、二、三期敝園之廣告

荔枝苗現有尺數  
4尺上、上、下、下、下、下、下、下  
3尺上、上、下、下、下、下、下、下  
2尺上、上、下、下、下、下、下、下  
109尺上、上、下、下、下、下、下、下

**驚人的好消息!!**

慶祝橫貫公路通車  
芳茂創立五十週年研究農場創設紀念對農友特別大優待大贈送四角郵票十張寄來以便贈送新優良品種及種苗目錄表一份品種由敝園指定長賜勿失凡買種子二十元以上顧客贈送一種多買多送敬請多多賜顧拜托多多介紹無任歡迎

◎果樹園圃雜貨用種子菊種子一籃兩二十元時勢漸漸變遷提早收成增加收益請用新豐年

經驗最久、信用第一  
增產報國、為農服務  
耕作愛進步、選種來芳茂  
獎勵新品種、發展大農村

**芳茂 種 苗 園**  
調 御 柳

蔬菜種子  
草花種子  
肉齒聖藥  
各種農藥  
噴霧器具  
其他各種

調撥儲金臺灣四八一號  
門市部：臺中市第二市場內  
採種場：臺中市南區樹義里