


農友知識

美國加州大學生物防治系的一位教授，曾發表一項飼養「吃蝸牛的蝸牛」計劃，想利用天敵來遏

「玫瑰蝸牛」，是露螺（非洲大蝸牛）的天敵，能够吃掉與它身體相等大小的小露螺，現在臺灣試養中。
露螺，是以前日本人誤當做「食用蝸牛」引進臺灣的，由於氣候適合它的生長，現在滿山遍野都是，成爲雜食多種農作物的大害蟲。（參看本刊六卷七期十頁）

臺灣試養「玫瑰蝸牛」



(左)「牛蝸」(右)「玫瑰蝸牛」與它的天敵

制這種討厭的露螺。（參看本刊六卷三期二十頁）

臺灣省農業試驗所與中央研究院的動物研究所合作，已經從夏威夷引進一批「玫瑰蝸牛」，現在農試所應用動物系的養蟲室中飼養，這批外國來的嬌客，在裝有冷氣的養蟲室中，受到很週到的招待，除了由昆蟲專家隨時注意它的生活狀況外，還有兩位小姐專侍候它們。

成熟的「玫瑰蝸牛」，比成熟的露螺要小，只有露螺的七八分之一，雖然它可以吃掉與它身體同等大小的露螺，但在那種情形下，吃起來是相當費力的，「玫瑰蝸牛」寧願吃比它本身較小的露螺。

本刊記者在養蟲室中參觀時，會看到有二角銀幣大小的「玫瑰蝸牛」，將它的口器伸進蠶豆粒大小的露螺體內，津津有味地吃着。
農試所養蟲室中必須繁殖大量的露螺，才够供應它們的食料，因此，那兩位小姐也相當忙碌了。

臺糖公司的屏東蔗作改良場，從琉球引進的幾隻「玫瑰蝸牛」，已經繁殖到相當多的個體，本省南部的氣候，也許更適合它們的生長。
這種吃蝸牛的蝸牛，還在試養的階段，將來是否可以放在田野裏讓它自行去尋找討厭的露螺，這其中還有許多技術上的問題需要研究解決。（林實）

颱風季節到了！

注意防範·減少損失

本省各有關機構，決定從今年起，每年六月份的第一週（今年爲六月五日至十一日）舉辦防颱宣

夏光番茄

耐暑力強，唯一能在平地夏季栽培成功之優良品種，去年鳳山熱帶園藝試驗所試作各品種中以夏光收量最多。

興農早生甘藍

結球成績極優移植後六十天就可收穫，爲現有早生藍中之最優系統，五月可開始播種。

鳳山極早生花椰菜

六月可開始栽培之極早生種，移植後四五天就能收穫。

潮洋目瓜

耐熱性強之節成種，一棵一斤餘之優良種。

觀音白菜

白莖扁甲，三十天左右就能收穫，耐熱性品種一棵達一臺斤以上。

新香瓜

由日本直接輸入之種子，圓型富甘味，味道極好的甜瓜。

赤福三號番茄

三十四月在員林茶市場，人氣最高之優良種。

今年之タネは

興農の種子に決めませう

四九年興農園藝新知識，鐵定五月末發行無償贈閱，請看興農園藝新知識採用興農之優良種子。

興農通信六月號免費贈送

興農種子行

本行：臺北縣三重鎮重新路一段四三號

電話：四五三三二號

郵政劃撥四〇二八號

員林分行爲擴展業務自三月二日遷移左記地址

分行：員林鎮民生路二七四號

三共株式會社出品

三 SANKYO 共

エンドリン 乳劑
(安特靈乳劑)

成分 19.5% 包裝 300 c.c. 瓶裝 每箱 30 瓶

適合防治之農作物害蟲

棉花：大小紅鈴蟲、金剛鑽等
大豆：各種主要害蟲
水稻：螟蟲

特長

- ①對廣範圍之害蟲具有殺滅效能
- ②藥力可以保持長久
- ③化學性安定可與各種殺蟲劑、殺菌劑及肥料混合使用
- ④對農作物很少藥害

出進口商 **泰洋股份有限公司**
地址：臺北市重慶北路二段 108 號
電話：4 4 9 9 4 號

傳，以提高大家對於颶風的認識和警覺。農作物的防颶工作，必需早為準備，本刊上一期已經刊登「防範颶風減少稻谷損失！」、「怎樣預防果園的颶風損害？」、「颶風吹動柑桔樹容易引起根腐病」，以及「認識颶風防範颶風」幾篇特稿，供給農友們參考。現在再提出颶風季節應注意的幾點事項，請農友們提高警覺注意實行。

- ① 離開河邊海邊低窪地帶，及不堅固的房屋。
- ② 關緊門窗，如不堅固，請加木板釘牢。
- ③ 容易被風吹落的物件，請儘量拿下，放到避風的地方。
- ④ 準備手電筒、蠟燭等以備停電時應用。
- ⑤ 小心火燭，以防火災。
- ⑥ 如無必要，請不要外出。
- ⑦ 斷落電線，請勿手觸，應報告電力公司修理。
- ⑧ 能够提前收穫的作物，應及早收穫。

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

豬、雞驅蟲藥之王 **阿司卡利肯** (粉劑) Askariken

(內藥登字第一四六四號)

「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症

最公認 最安全

- ① 效力強大！殺蟲之力百分之九十五以上。絕無副作用。藥力持久。成蟲、蟲卵均死滅。
- ② 用法簡單！投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。
- ③ 價格最廉！豬一頭一元，成雞一隻僅五分。價可獲得數百倍利益。
- ④ 價格最廉！豬一頭一元，成雞一隻僅五分。價可獲得數百倍利益。

注意：「使用「阿司卡利肯」添加飼料投與時，飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料裡」（會嘔吐）

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理 **臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司**
臺北市信義路二段一二〇號

⑨ 插立樹木的支架支柱。

⑩ 檢查排水溝，預防水患。

⑪ 修剪樹木，預防風害。

⑫ 海上的船隻應設法遠離颶風，或趕緊駛進避風港。

臺中目瓜

南部的夏季胡瓜品種，以「臺中目瓜」最為良好。二至六月播種，用潤約一、二公尺的高畦，栽二行，株間五十公分，瓜株約本葉五葉時插支柱。輕粘質壤土可栽培胡瓜，但因爲胡瓜爲淺根作物，最怕乾燥，所以一定要在灌水方便的土地栽培。基肥多施堆肥，追肥用人糞尿，每七天左右施一次。播種後大約五十天已可採收大瓜。

臺語中「臺中目瓜」的「目」字，與「節」字的意思一樣，所謂「目瓜」，有每一節都會生瓜的意思。（陳文郁）

國立臺灣大學獸醫學系教授 劉崇標博士推薦

用請猪母的 血 食 槽 乳 母

命寧安猪

越卓効功片一日一

品聖的疫肺、劑白猪子防預

廠物藥畜家春鴻

六之號八一安長鎮橋板縣北臺
號一一八三第灣臺金備撥劃

說明書 備索

