

一、在一期秧田裏有少數的紅頭害蟲。  
二、插秧後秧葉有很細的蟲蛋，經過十天左右就產生歌體的害蟲，食害秧葉。未知這是什麼害蟲？  
請將該害蟲的防治特效藥示知。(臺北縣三峽鎮鄉親與)

【答】：所附寄來的標本為負泥蟲，可撒布有效成份1% B D C 粉於秧面上，防治之，每公頃二十公斤即可。(陶家駒)

防治柑桔炭疽病

可使用波爾多液

【問】：我所栽培的柑桔，每年到春節過後，葉面就發現黃點，但是現時已有小粒。不知要用什麼農藥噴射？如何防治葉片黃點的發生？附上柑葉，敬請指教。(彰化縣黃泗川)

【答】：該病已經檢驗，知為「柑桔炭疽病」。為預防該病，應使果樹保持健壯姿態(如肥料配合，疏果及剪枝等)，即可不會發生。若發病嚴重時，可以使用波爾多液噴射。(莊德榮)

自製菸精噴射柑桔

可防治潛葉蛾蚜蟲

【問】：一、請問自製菸精(菸葉和水烤出之油液)可以噴射柑桔嗎？加水幾倍？可防治何種害蟲？  
二、此菸精可與馬拉松乳劑混合使用噴射柑桔嗎？又可以和其他何種農藥混合使用？(嘉義縣張瑜)

【答】：一、自製菸精可以噴射柑桔，加水二十倍左右(視製造之深淺而異)，可以防治柑桔潛葉蛾，蚜蟲及茶樹之多數害蟲。  
二、除與石灰硫磺合劑混用應注意外，其他藥劑均可與其混合。(莊德榮)

蜜蜂不會損傷花器

可增加柑桔花受精

【問】：有一種叫「糖蜂」的蜜蜂，這種蜂對於柑桔花，是否有害？在柑桔盛開之季，假如有害的話，又有何防除方法？(頭份鎮林耀煥)

【答】：蜜蜂對柑桔之花器不會損傷，它

僅採集花粉及吸取花蜜，因它採花工作尚可增加柑桔花之受精，故對柑桔是有好處。(林珪瑞)

仔豬斷乳後

可用生飼料

【問】：一、仔豬斷乳後，何時可用生飼料？  
二、普通農民飼養的改良種雌豬可做母豬嗎？何以一般人喜將它留做母豬？(新竹縣新埔鎮陳雙喜)

【答】：一、仔豬斷乳後即可應用生飼料，要適應仔豬習慣吃乾飼料，最好在仔豬生下來三星期後，就開始給些混合的乾飼料使之適應以作訓練，使之漸漸習慣，斷乳後食乾飼料則毫無困難。  
二、通常農民所飼養的雜種母豬(盤克夏公豬配本地母豬之一代雜種)是可以作為三品種之種母豬，雜種母豬與另外一種公豬如約克夏或漢布夏交配後所產之後代就是三品種之仔豬了，生長快，發育好，飼養較為經濟。(李登元)

漆樹種植地區

新竹以南較宜

【問】：一、在士林鎮內雙溪一帶山地，是否適於種植漆樹？  
二、何處有出售漆苗，種植方法及土壤季節如何？有何銷路？(士林鎮邱紹源)

【答】：一、漆樹在新竹以南地區海拔一百公尺至九百公尺左右比較適宜，士林鎮一帶不很適合。  
二、漆樹造林要點：  
①土地：應選在排水良好及避風的地區。  
②季節：每年三、四月間栽植。  
③種植方法：每公頃種植三千至三千三百株，亦可採用等邊三角形之造林法，株距行距均為四公尺，栽植苗木前應將枝葉剪除，或於栽植後離地面約兩公分處剪去其枝幹，使之再萌新枝，更可提高其成活率。  
④漆苗：一年生造林季節已過，如明年度要造林，可試向臺灣省林業試驗所或縣政府(新竹以南各縣)申請配給苗木。(林文鎮)

公司：臺北市中正路1791號二樓  
電話：31691  
工廠：北基公路七堵草蓋站旁  
電話：七堵35號

五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

Folioi-E605  
富粒多  
1000 cc  
250 cc  
鋁瓶裝

巴拉松乳劑  
馬拉松乳劑  
安特乳劑  
大利農乳劑  
克羅本乳劑  
魚寶  
家虫敵  
螞蟻藥

現貨應市

經銷處

- ① 臺北市中正路1791號二樓 五豐公司 電話：31691
- ② 臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話：44253
- ③ 桃園縣中正路103號(大廟後) 農友行 電話：743
- ④ 新竹市中華路226號 青果合作社 電話：25
- ⑤ 新竹市中央路92號 新和農產行 電話：938
- ⑥ 苗栗後龍中正路 新源和西藥行 電話：6
- ⑦ 臺中市三民路114號 信全農藥行 電話：3343
- ⑧ 員林中山路229號 信隆 電話：184
- ⑨ 南投草屯中山街 信隆 電話：185
- ⑩ 雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話：2964
- ⑪ 嘉義市中山路257號 新高藥局 電話：4971
- ⑫ 臺南市東門路140號 永豐藥行 電話：4971
- ⑬ 高雄縣鳳山鎮第二市場內 農友種子行 電話：4971
- ⑭ 高雄縣大樹鄉脚村42號 昌商商店 電話：4971
- ⑮ 屏東潮州中山路54號 中德農藥行 電話：4971
- ⑯ 臺南鎮更生路192號 農友供應社 電話：4971
- ⑰ 臺南市西門路44號之1 和美米行 電話：4971
- ⑱ 臺南縣佳里鎮文化路31號 瑞美 電話：4971