

將來肥料不能預料

有谷還請趁早換肥

續不好的原因，據糧食局分析為：一、八七水災關係，上期稻作收成欠佳，農民沒有足夠的餘糧，糧價就開始上漲，到現在還沒跌下來，農民感覺用稻谷換肥不划算。三、農民手上還有去年剩存的肥料使用，不急着換肥。貿易談判中，對輸入肥料問題還沒有達成協議，要到秋天才能繼續商談，那時即使談妥了，製造裝運，均需時日，因此，今年二期作肥料供應很可能發生問題，今天能有肥料分配，不如趁早準備一點，以防萬一的好。

今年一期作肥料分配，成績不如往年，據糧食局統計，到五月廿七日止，只配出了百分之七十六點一。

本期的配肥計劃數量為二五一、三二五公噸，實際配出一九一、二五八·八公噸。成

本省耕牛的主要外寄生蟲，有牛壁蟲與牛蠶兩種。

牛壁蟲

牛壁蟲

成蟲

公蟲

一·七

×

一·二

公厘

(m.m.)

母蟲

一·三

×

七·五

公厘

(m.m.)

公蟲

三

公厘

(m.m.)

母蟲

三·二

公厘

(m.m.)

公蟲

二

公厘

(m.m.)

母蟲

二·一

公厘

(m.m.)

母蟲

一·九

公厘

(m.m.)

母蟲

一·八

公厘

(m.m.)

母蟲

一·四

公厘

(m.m.)

母蟲

一·二

公厘

(m.m.)

母蟲

一

公厘

(m.m.)

母蟲

零

公厘

(m.m.)

母蟲

期浸一次。

夏天最好在傍晚

避免陽光直射。

預防：

留意放牧地

感染病源。

避光

公厘

都具有

三對腳。

母蟲

在牛的皮

毛上產卵

孵化成幼蟲

繼續寄生

牛體。

治療：

與牛壁蟲一樣。

用BHC

也很有效

剪掉牛毛

可除大部份蟲體

並容易接觸藥

液。

預防：

燒却牛舍內不潔

的藁草等。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

T溶液

或2%

藤精溶液

噴射或塗

擦牛身。

原因：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六%

，藥用肥皂○

二○

亞硫酸○

一○

，木餉油○

二○

，水九八·四○

。浸浴

時間三至五分鐘

，每隔二星

期。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六○

，藥用肥皂○

一○

，木餉油○

一○

，水九八·四○

。浸浴

時間三至五分鐘

，每隔二星

期。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六○

，藥用肥皂○

一○

，木餉油○

一○

，水九八·四○

。浸浴

時間三至五分鐘

，每隔二星

期。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六○

，藥用肥皂○

一○

，木餉油○

一○

，水九八·四○

。浸浴

時間三至五分鐘

，每隔二星

期。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六○

，藥用肥皂○

一○

，木餉油○

一○

，水九八·四○

。浸浴

時間三至五分鐘

，每隔二星

期。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六○

，藥用肥皂○

一○

，木餉油○

一○

，水九八·四○

。浸浴

時間三至五分鐘

，每隔二星

期。

原因：

伊告醫生

要記着

後以

耳撲莫萬千

。治療：

用藥浴法治療。

藥

液的配方：

結晶炭酸鈉○

六○

，藥用肥皂○

一○

，木餉油○