

將來肥料不能預料

有谷還請趁早換肥

今年一期作肥料分配，成績不如往年，據糧食局統計，到五月廿七日止，只配出了百分之七十六點一。

本期配肥計劃數量為二五一、三二五公噸，實際配出肥不算。三、農民手上還有去年剩存的肥料使用，不急著去換肥。

原因：據糧食局分析為：一、本刊仍望農民儘速到農會去提領肥料。因為最近中日兩國貿易談判中，對輸入肥料問題還沒有達成協議，要到秋天才能繼續商談，那時即使談妥了，製造裝運，均需時日，因此，今年二期作肥料供應很可能發生問題，今天能有肥料分配，不如趁早貯備一點，以防萬一的好。

本省耕牛的主要外寄生蟲，有牛壁蝨與牛蝨兩種。

牛壁蝨 充分吸血的牛壁蝨成蟲，公蝨一·七×一·二公厘(m.m.)，母蝨一三×七·五公厘，有四對腳。母蝨在地面上產卵。孵化後的幼蝨，爬上草葉，等待寄主(牛)。沒有找到寄主的幼蝨，可在地面上存活半年之久。

治療：牛數少時，可用5%DDT溶液，或二%魚藤精溶液噴射或塗擦牛身。

牛數多時，可用藥浴法治療。藥液的配方：結晶炭酸鈉○·六%，藥用肥皂○·六%，鉀砒酸○·二%，木鱉油○·二%，水九八·四%。浸浴時間三至五分鐘，每隔二星


期浸一次。夏天最好在傍晚浸浴。二至三天內避免陽光直射。預防：留意放牧地感染病源。

牛蝨 牛蝨成蟲，公的是二公厘，母的是三公厘，都具有三對腳。母蝨在牛的皮毛上產卵孵化成幼蝨，繼續寄生牛體。

治療：與牛壁蝨一樣。用BHC也很有效。剪掉牛毛，可除大部份蟲體，並容易接觸藥液。

預防：燒却牛舍內不清潔的莖草等。

· 基永李 · 蝨壁牛與蝨牛



圖大蝨蝨壁牛與蝨牛



，伊告勸生醫
，除要着惡後以
。耳撫莫萬千



，耳入插枝竹
，滴那血行那
。醫去就緊趕
。(恙無得幸)志代無我佳



，邊畔田到行
，意注無時一
，伊着街車騎
。(倒街)離離倒人雙