

堆肥，以及養豬的收入，都將受到影響。

※ ※ ※ ※ ※

農友們！爲了本省的養豬事業，同時也爲了你自己，養豬一定要打預防針！

六月份芋與藕的肥培管理

王進生



芋：芋應在六月施用第三及第四次追肥。每十公畝地（一分地）施用量每次約爲硫酸銨十四公斤，氯化鉀六公斤。爲提高單位面積的產量，應該注重後期施肥，尤應多施鉀肥，以提高澱粉含量。

施第三次追肥時，要同時培土。六月中，根群已相當多，培土應儘量避免傷害根部。培土的高度爲十至十二公分。從栽植至這一次（即第三次）培土，應構成三十公分左右的高畦，第四次追肥時，可不再培土。土壤過乾時，必需在傍晚時行畦間灌溉，如遇長期乾燥，應每星期灌溉一次。

在陰濕而且通風不良的地方種芋，容易發生疫病。應在發病前噴射加用展着劑的「水銀波爾多液」預防。

藕：應在莖葉蔓延圍場以前，施用最後一次追肥。每十公畝地約施用硫酸銨十八公斤，

氯化鉀二十公斤，在可能範圍內還應在行間施下腐熟堆肥（每十公畝六六公斤以上），假如沒有堆肥時，可用雞糞（每十公畝地一百公斤）代替。藕也是一種澱粉蔬菜，所以應施充分的鉀肥。

近年來藕常發生腐敗病，最初葉面發生黑色斑點，最後根莖形成褐色病斑而腐敗。在六月中假如發見這樣的病徵，應經常保持深水十至十二公分，灌溉水應常流動，假使田面不平整，應在六月中用手勻平，不可有露出水面之處。少用氮肥也是預防本病的一個方法。

甘藷間作玉米

——張新吉——

雲林縣西螺鎮謝下露農友來信說，他計劃在甘藷田裡間作玉米，不知適不適宜？

甘藷田間作玉米，是很合理的耕作方法。今後政府將推廣在每一甘藷畦底播種玉米，播種時期是十月上、中旬以前，甘藷中耕除草完畢後。株距以一臺尺爲適當。對於甘藷產量之影響，今年將在玉米研究中心試驗。

玉米品種以雜交種「臺南五號」產量較高，每公頃產量約五千公斤。種子可在今年八至九月間向當地農會洽購。



野田式 174 耕耘機

現貨大批運到 歡迎參觀訂購

力異單深廉
馬優簡最低
大能轉耘格
強性運耕價

型固油想觀
新堅省理美
最最最最

NB型九·五馬力驅動迴轉式 ● 詳細說明書函索即寄



ND型七馬力犁耕驅動迴轉兼用型

定比美意願
安無十滿賜
耕強全證觀
犁力十保參
均重靠到較
平載可週比
機身搬實務迎
機運誠服歡

臺灣總代理

宏業商行農機部

臺北市重慶北路二段四號（圓環邊）