

農業知識

夏天蜂群應停放在陰涼通風的地方；冬季應放在避風向陽溫暖的場所。

有時工蜂羽化兩翅捲起，這表示巢箱中太過乾燥，可加水於巢箱中預防。

在本省還沒有專門廠家製造養蜂器具出售，一般養蜂者都是自行設計製造或雇人代製。（林珪瑞）

金線黑皮越瓜

南部栽培的越瓜品種，以「金線黑皮瓜」最為良好。此品種生育強健，耐病又抗蟲，果形大，果肉厚，栽培容易，收量及品質都很理想。種子在南部各種子店都可以買到。

越瓜適於各種土壤栽培，保水力弱的土壤，如能灌水，也可栽培成功。


南部的越瓜栽培適期是二月至十月，如在二月間播種，應注意下列各點，才能得到良好的成績：①應選較溫暖避風的地方栽培。②多施堆肥使根部發育旺盛。③畦面撒草宜厚，以保持土壤溫度。④南部冬季氣候特別乾燥，應注意灌水，不可使土壤過乾。⑤容易發生炭疽病、霜霉病，及白粉病，應注意噴「大生」及「可利生」等藥劑防治。（陳文郁）

蜜蜂、蜂蜜、蜂王

本省目前所養的蜜蜂，多為意大利蜂種。蜂王好壞，對於蜂群的盛衰非常有關係。蜂王強健，產卵力強而群勢旺盛，因而採蜜力大，收蜜量必定豐富。

蜂王並不需要年年換，假如蜂王強健產卵力高時，二三年換一次就可以了。假如第一年產卵力不理想，可在第二年早春換王。

如須蜂王，可採用除王，促進造王，就是將強群蜂王除去或另分箱，讓本箱再造王較為理想。假如蜂巢中貯蜜量過少，就表示外間缺少蜜源，應補給二分之一的糖水，不必除去幼蟲或分箱。



蟲線白尖病受害白菜的大放下鏡微顯

線蟲有數千種之多

本刊第六卷第二十期曾經向各位介紹過爲害鱗麻的根瘤線蟲，這只不過是線蟲的一個種類，目前已知的線蟲，有數千種之多，有的寄生在動物或人體裡，有的生存在江河池沼的清水裡，此外還有大數種類生存在土壤裡。

土壤裡的線蟲又可分爲有害和有益的二群。能直接侵害植物體的線蟲，就有二百種左右。一世紀來，許多研究證實，所有農藝或園藝作物，都有線蟲的存在。稻葉白尖病，就是由線蟲爲害而引起的。

線蟲體很小，用肉眼是看不見的。所以農友

們終生在同一土地上耕作，也不會看見線蟲。

線蟲靠卵繁殖，奇怪的是，它們雖有雌雄性的分別，但是在生殖時，並不一定需要雄蟲。

線蟲對惡烈環境的耐力非常驚人。據試驗證明，寄生在小麥的線蟲，經二十八年的乾燥貯存後仍能復活。一種寄生在燕麥的線蟲，貯存三十九年仍沒有失去生機。

雖然線蟲隨時會遇到敵害，但是它會像其他的寄生蟲一樣，在沒有被消滅之前，繁殖更多的後代來綿延種族。一個雌性根瘤線蟲，可以生產五百粒以上的卵，而且在環境適宜時，七天就可完成一個生活循環，假使在一塊土地上只有幾個存活的線蟲，只要經過一個夏天讓它不斷地繁殖，所產生後代的數目，必定是很驚人的。

世界上的農作物，每年因線蟲而引起的損失，目前還沒有正確的統計數字，可是據美國的報告，土壤施用燻蒸劑防治線蟲後，作物收穫量增加百分之二十五至五十，可見線蟲的爲害，是不容忽視的。（洪元平譯）

宅前宅後種檳榔

檳榔播種時較密，幼苗長大後移植，逐次加大距離。幼苗生長期間，常行除草，施用糞尿一、二次，並注意培土，以防根部露出。

移植時期以初夏四、五月較適宜，秋冬也可以移栽，但是苗的發育較慢，而且容易受旱害。移苗時應儘量帶土，並剪去一部份的老葉，中心嫩葉不

可剪除。

檳榔樹冠發育不大，定植距離普通只二公尺左右。

種在果園菜園四週，或宅前宅後的檳榔，多不另施肥。

栽檳榔而兼植薯葉時，可在薯葉根旁施肥，檳榔自然就可吸收肥料。多用花生餅、蓖麻餅等，酌加過磷酸石灰。

檳榔易受圓介殼蟲為害，可用夏油乳劑（四十至五十倍），或松脂合劑（冬季約二十五倍，夏季約四十至五十倍）防治。（黃菊臣）

臺灣的鼈

臺灣的鼈（甲魚）大致在五月至八月間產卵，每頭雌鼈每次產卵二、三十個，在產卵期內約產三次至五次。

鼈卵通常在砂穴中孵化。砂穴需要保持適當的溫度。砂溫在攝氏二十五至三十度，需五十天左右孵化。


鼈卵用孵卵器孵化時，可將卵埋入一寸左右經消毒的河砂。為使河砂潤濕，可使用膠管，內裝棉心，一端置於砂中，他端通水槽。孵卵器保持溫度在攝氏三十度，約四十天左右即可孵化。

剛孵化出來的小鼈，容易受傷害，需要養在小容器中，用紅蟲、孑孓或水生蚯蚓等飼餵。稍大後，應按大小分別飼養，否則會相互殘食。（唐允安）

蘭花的施肥

洋蘭所需養份很少，栽培時所用的栽培材料，已可供給，並可向空中吸收一部份，所以，在栽培未有經驗以前，最好不用肥料，有相當經驗後，再慢慢試用少量肥料。假如肥料施用過多時，容易爛根傷花傷葉，使生長不正常，要特別注意。

施肥時期，以生長期，具備高溫、長日、溫度適當、通風良好等條件，春夏之間（除添暑期）為宜。至於施肥的方法，因蘭花種屬不同略有差異，用化學肥料時以Hyponex（蘭花專用肥料）為宜。腐熟肥料以二斤豆餅泡一斗水，放在避雨處，等腐熟後（夏季約一個月，冬季約二個月），以澄清液加水三至五十倍施用，愈稀愈好，每十一次。（鄧達文）



冬季約二個月
約一個月，以澄清液加水三至五十倍
一次。（鄧達文）

國立臺灣大學醫學院系教授
劉榮博士 樂士推萬

血禽

禽癌

乳舞

一曰功効卓越

家畜藥物廠

鴻春

安長鎮板橋縣北臺金備撥計劃

一次。